

İmal tarihi :
Son kullanma tarihi :
Şarj No: (Damga ile) :
Ruhsat tarih ve No'su : 05.03.2012 - 8599



KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

COPERHID® SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	M:1	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
	361.1 g/L	Metalik Bakıra eşdeğer bakır hidroksit

Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmayınız.
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün süre ile insan ve hayvan uygulama yapılmış sahaya giremez.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım talimatına uyunuz.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Ağızda madeni bir lezzet, kanlı ishal, yeşil-mavi renkli kusma, hızlı solunma, heyecan, baş dönmesi, baş ağrısı, halsizlik, mide bulantısı, bulanık görme, fazla miktarda alındığında (5-8 gr.) mide ve bağırsaklarda ağır metal zehirlenmesi, su ve elektrolit kaybıdır.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Solunum yollarının açık kalmasını sağlayın. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Solunum zorluğu çekildiğinde, uygun eğitilmiş personel tarafından kazazedeye oksijen verilebilir. Tıbbi yardım alın. Bilinci yerinde olmayan kişiyi ilk yardım pozisyonunda yan tarafına yatırın ve solunumun gerçekleşebilmesini sağlayın. **Yutma** Ağız suyla iyice çalkalayın. Birkaç bardak su veya süt için. Kusma tehlikeli olabileceğinden dolayı, kazazede kendini rahatsız hissederse kusmayı durdurun. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Bilinci yerinde olmayan kişiyi ilk yardım pozisyonunda yan tarafına yatırın ve solunumun gerçekleşebilmesini sağlayın. Kazazedeyi gözlem altında tutun. Tıbbi yardım alın.

Cilt teması Su ile yıkayın.

Göz teması Hemen bol su ile yıkayın. Gözlerinizi ovmayın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin ve tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Aktif kömürle mide yıkanır, kan dolaşımına yardım maksadıyla Plazma ve Novadrol tatbik edilir.

UZEM (ULUSAL ZEHİR DANISMA MERKEZİ) TEL: 114

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.

Net Miktarı (kg veya L)
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Bakırhidroksit



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H330 Solunması halinde öldürücüdür.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P403+P233 İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklara zehirlidir, su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Anılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında kullanmayınız.
- Ürünü kendi ambalajında ağız kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boş ürün ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.

Ünet SAZAK
Ankara Bölge Müdürü.

KORUMA KLOR ALKALİ
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Denizcilik İşleri Bakanlığı
Denizcilik Genel Müdürlüğü
Tic. Sic. No: 274000 7382
Tic. Sic. No: Derince 419

12 Şubat 2018
GIDA TARIMI ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

BITKİ KORUMA URUNUNUN KULLANMA ŐEKLİ:
ZEYTİN HALKALI LEKE:

Marmara Bölgesinde:

- 1.Uygulama: Sonbaharda sürgünler görölmeden hemen önce
- 2.Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce

- Ege Bölgesinde:
- 1.Uygulama: İlkbahar sürgünleri görölmeden hemen önce
 - 2.Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Akdeniz Bölgesinde:

- 1.Uygulama: Hasattan sonra
- 2.Uygulama: İlkbahar sürgünleri görölmeden önce
- 3.Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, yapılmalıdır.

BAĞ MİLDİYÖ:

- 1.uygulama: Sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır.
- 2.ve sonraki uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortamları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığıında uygulamalara son verilmelidir.

BAĞ ÖLÜKOL:

Kış uygulaması: Budamadan sonra gözler uyanmadan hemen önce yapılmalıdır.
Yaz uygulaması:

1. Uygulama: sürgünler 2-3 cm olduğunda
2. Uygulama: sürgünler 8-10 cm olduğunda
3. Uygulama: sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE YAPRAK DELEN (KAYISI):

- 1.Uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
- 2.Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde)

Kayısılarda ilave olarak meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3. Uygulama yapılmalıdır.

TURUNÇGİL KAHVERENGİ LEKE:

Uygulamalara, sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması amacıyla 15-20 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir. Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

ELMA KARALEKESİ:

- 1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
- 2.Uygulama: Pembe-Beyaz rozet tomurcuğu döneminde (çiçeklerayrı ayrı görüldüğünde)
- 3.Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
- 4.Ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün arayla yapılmalıdır.

DOMATES MİLDİYÖ

Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz küllü gibi örtüsünün görölmesi ile uygulamaya başlanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

COPERHİD SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M:1 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **COPERHİD SC** 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M:1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŐABİLİRLİK DURUMU:

Organik fosforlular ve düşük pH'lı (asidik) bitki koruma ürünleri dışındaki bitki koruma ürünleri ile karışabilir.



KORUMA Klor ALKALİ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.

COPERHİD® SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	M:1	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
		361.1 g/L Metalik Bakıra eşdeğer bakır hidroksit

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile üretilen ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir deęişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orjinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA:

KORUMA Klor ALKALİ SAN. VE TİC. A.Ő.

Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No: 43

Derince-41900 / KOCAELİ

Tel : (0 262) 239 22 70 (2 hat)

Fax: (0 262) 229 33 24

®= KORUMA Klor ALKALİ SAN. VE TİC AŐ. 'nin tescilli markasıdır

Ünet SAZAK
Ankara Bölge Müdürü.
KORUMA Klor ALKALİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ő.
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad.
No: 43 / 41900 KOCAELİ
Tel: (0 262) 239 22 70
Fax: (0 262) 229 33 24
Tic. Sic. No: Derince 419

Dr. Funda BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.
12 Subat 2018
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŐTİR