İmal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son kullanma tarihi : (" ")
Şarj No :
Ruhsat tarih ve no : 03.06.1976 & 1036

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR			
BİTKİ ADI	**ZARARLI ORGANİZMA ADI**	**UYGULAMA DOZU**	**SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE**
ANTEP FISTIĞI	Karazenk *(Pseudocercospora pistacina)*	300 g/100 L su	28 gün
ARMUT	Karaleke *(Venturia pirina)*	300 g/100 L su	21 gün
ELMA	Karaleke *(Venturia inaequalis)*	300 g/100 Lsu	21 gün
ŞEFTALİ	Yaprak Delen *(Coryneum beijerinckii)*	300 g/100 L su	21 gün
SOĞAN	Mildiyö *(Peronospora destructor)*	200 gr/100 L su	28 gün
NOHUT	Antraknoz *(Ascochyta rabiei)*	200 g/100 kg. tohum 200 g/100 L su yeşil aksam	-- 28 gün
HIYAR	Kabakgillerde Mildiyö *(Pseudoperonospora cubensis)*	170 g/100 L su	28 gün
FASULYE	Pas*(Uromyces phaseoli)*	200 g/100 L su	28 gün
	Antraknoz *(Colletotrichum lindemuthianum)*	200 g/100 L su	28 gün
DOMATES	Yaprak Küfü *(Cladosporium fulvum)*	200 g/100 L su	28 gün
	Mildiyö *(Phytophthora infestans)*	200 g/100 L su	28 gün
SEBZE FİDELERİ	Çökerten ve Fide Kök Çürüklüğü *(Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Alternaria spp.,Sclerotinia spp.)*	200- 250 g/100 L su	28 gün
HIYAR	Köşeli Yaprak Lekesi *(Pseudomonas syringae pv. lachryman)*	200 g/100 L su	28 gün
KAVUN, KARPUZ	Antraknoz *(Colletotrichum lagenarium)*	200 g/100 L su	28 gün
DOMATES, PATLICAN, PATATES	Erken Yaprak Yanıklığı *(Alternaria solani)*	200 g/100 L su	28 gün
BUĞDAY	Adi Sürme *(Tilletia foetida, T. Caries)*	150 g/100 kg. tohum	---
	Sarı Pas *(Puccinia striiformis)* Kahverengi Pas *(Puccinia recondita tritici)* Kara pas *(Puccinia graminis tritici)*	350 g/da.	28 gün

23 Ekim 2017
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

KORUMA

KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DİKOTAN® M-22

ISLANABİLİR TOZ(WP)

GRUBU	M3	FUNGİSİT(MANTAR İLACI)

% 80 Maneb

Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmayınız
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün buhar ve / veya zerrelerini solumayınız.
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
Deri ve göz ile temasından kaçınınız.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım talimatına uyunuz.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:
Baş dönmesi, mide bulantısı, bulanık görme, deri iltihabı, burun iltihabı, halsizlik.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:
Genel bilgi Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin.
Soluma Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Solunum yollarının açık kalmasını sağlayın. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Solunum zorluğu çekildiğinde, uygun eğitimli personel tarafından kazazedeye oksijen verilebilir. Tıbbi yardım alın. Bilinci yerinde olmayan kişiyi ilk yardım pozisyonunda yan tarafına yatırın ve solunumun gerçekleşebilmesini sağlayın.
Yutma Ağzı suyla iyice çalkalayın. Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınız. Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın.
Cilt teması Ciltte kalan parçaları temizleyin. Maddenin hemen cildin üzerinden alınması önemlidir. Gelişmekte olan herhangi bir hassasiyet belirtisi durumunda, daha fazla maruziyetten kaçınılmalıdır. Kirliliği sabun ve suyla veya bilinen cilt temizleyici bir madde ile temizleyin. Yıkamanın ardından belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.
Göz teması Su ile yıkayın. Gözlerinizi ovmayın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) TEL: 114

T.C. 1927

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.

Net Miktarı (kg veya L):
Azami perakende satış fiyatı(KDV dahil)

İÇİNDEKİLER: **MANEB**

ZARARLILIK İŞARETLERİ:

UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332 Solunması halinde zararlıdır.
H361 Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ
P202 Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.
P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/ bakım alın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/ müdahale alın.
P337+P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/ bakım alın.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

Ömer SAZAK
Zir. Müh.
KORUMA KLOR ALKALİ Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad No:43 Dilovası/KOCAELİ
Tepecik V.D. 564 000 7582
Tic. Sic. No: Derince 419

PATATES	Mildiyö *(Phytophthora infestans)*	300 g/100 L su	14 gün
	Adi Uyuz *(Streptomyces scbies)*	1600 g/100 kg. tohum	---
YERFISTIĞI	Yaprak Lekesi *(Cercospora arachidis)*	250 g/100 L. su	28 gün
ŞERBETÇİOTU	Mildiyö *(Pseudoperonospora humuli)*	150 g/100 L su	7 gün
KARANFİL	Pas *(Uromyces dianthi)*	200 g/100 Lsu	----
ASPİR	Yaprak Lekesi *(Alternaria carthami)*	200 g/100 L su	7 gün
BAĞ**(***)	Ölü Kol *(Phomopsis viticola)*	200 g/100 L. su	21 gün
ŞEKER PANCARI	Cercospora yaprak lekesi *(Cercospora beticola)*	250 g/100 L su	28 gün
KAVUN (TARLA-SERA)	Kabakgillerde Mildiyö *(Pseudoperonospora cubensis)*	170 g/100 L su	28 gün
CEVİZ	Antraknoz *(Gnomonia leptostyla)*	300 gr/100 L su	21 gün

* Fidelik ilaçlamalarında verilen iki doz hastalık yoğunluğuna ve bitki vejetasyon süresine göre değişmektedir.
** Yalnızca yaz uygulamasında kullanılır.
***** Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz**

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılmalıdır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:
Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:
ANTEPFISTIĞI KARAZENK
1.Uygulama: İlk enfeksiyonların başlamasından önce yapılması gerekmektedir. Bu uygulama, çiçek dökümünden sonra, döllenmeyi takiben meyvelerin buğday danesi büyüklüğüne ulaştığı devrede yapılmalıdır.
2. Uygulama ve diğer uygulamalar: Hastalık için uygun enfeksiyon koşulları devam ettiği sürece 15 gün aralıklarla devam edilir.

ELMA VE ARMURT KARALEKESİ:
1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2.Uygulama: Pembe-Beyaz rozet tomurcuğu döneminde (çiçeklerayrı ayrı görüldüğünde)
3.Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
4.Ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünlerin etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

23 Ekim 2017
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KORUMA

KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DİKOTAN® M-22

ISLANABİLİR TOZ(WP)

GRUBU	M3	FUNGİSİT(MANTAR İLACI)

% 80 Maneb

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Her türlü su ve su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Kolayca alev alan bir buhar oluşturduğundan ambalajları iyice kapatılmalı ve ateş bulunan yerlerden uzak, çocukların ulaşamayacağı kapalı yerlerde saklanmalıdır.
- Etkinliğinin azalmaması için muhafaza edilen yerlerin kuru olmasına dikkat edilmelidir.
- Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile üretilen ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:
Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

Ömer SAZAK
Kr. Müh.
KORUMA KLOR ALKALİ Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Deniz Mah. Cumhuriyet Cad. No:43 Derince-KOCAELİ
Tepecik V.D. 564 000 7532
Ticaret Sic. No: Derince 419

KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DİKOTAN® M-22

ISLANABİLİR TOZ(WP)

GRUBU	M3	FUNGİSİT(MANTAR İLACI)

% 80 Maneb

ŞEFTALİ YAPRAKDELEN:
1.Uygulama: Sonbaharda, yaprak dökümünden hemen sonra
2.Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları kabardığı dönemde, çiçekler açmadan önce yapılır.

BAĞ ÖLÜKOL: Yaz uygulaması:
1. Uygulama: sürgünler 2-3 cm olduğunda
2. Uygulama: sürgünler 8-10 cm olduğunda
3. Uygulama: sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

SOĞAN MİLDİYÖ:
Günlük ortalama sıcaklığın 16°C'ye ulaşması ve orantılı nemin %80'i bulması ile mücadeleye başlaması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile uygulamaya başlanabilir.

HIYAR VE KAVUNDA (TARLA-SERA) MİLDİYÖ: Uygulama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamalar bitkinin her tarafı, özelliklede yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

HIYAR KÖŞELİ YAPRAK LEKESİ: Tarlada hastalık görülmeden veya ilk görülmeye başlandığında koruyucu olarak 10 gün ara ile en az 3 uygulama şeklinde yeşil aksam uygulaması yapılmalıdır.

DOMATES YAPRAK KÜFÜ: Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir.

DOMATES MİLDİYÖ: Mücadeleye çevredeki domates yapraklarının 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle ve hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

DOMATES, PATLICAN, PATATES ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ürünün etki süresine bağlı olarak uygulama tekrarlanmalıdır.

SEBZE FİDELERİNDE ÇÖKERTEN VE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ: Ekim öncesinde tohumlar 100 kg tohuma 200 g ürün gelecek şekilde karıştırılarak uygulama yapılır.

NOHUT ANTRAKNOZU:
Tohum uygulaması: Tohum ekiminin yapılacağı gün uygulanmalıdır.
Yeşil aksam uygulaması: uygulamaya günlük ortalama sıcaklığın 10 C° ve orantılı nemin en az %80 olması durumunda başlanması gerekirse de, pratik olarak yörede hastalığın ilk belirtileri görülmesi ile başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Uygulamanın yapıldığı gün şiddetli yağış oluşmuşsa uygulama tekrarlanmalıdır.

FASULYE ANTRAKNOZU: Yörede ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle birlikte uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Bitkinin tüm yeşil aksamının bitki koruma ürününün uygulanmasına özen gösterilmelidir.

FASULYE PASI: Çevrede fasulye bitkilerinin yapraklarında pas püstüllerinin görülmesinden itibaren uygulamaya başlanmalı ve hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilmelidir. Kuru fasulyede olgunlaşma döneminde hastalık görüldüğünde ekonomik ürün kayıplarına neden olmadığından uygulamaya gerek yoktur.

KAVUN-KARPUZ KABAKGİLLERDE ANTRAKNOZ: Günlük ortalama sıcaklığın 16 C olması ve ortalama nemin %80'e ulaşması ile mücadeleye başlanması gerekirse de; uygulamada en pratik yol, çevrede kavun-karpuz bitkilerinin yaprak ve saplarında ilk antraknoz lekelerinin tespiti ile uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir.

Ünet SAZAK
Zir. Müh.
KORUMA KLOR ALKALİ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No:43 Derince/KOCAELİ Tepecik V.D. 864 000 7582 Tic. Sic. No: Derince 419

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V

23 Ekim 2017

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

BUĞDAY ADİ SÜRME: Tohumlara ekim öncesi, önerilen dozda uygulama yapılmalıdır.

BUĞDAY PAS HASTALIKLARI:
Sarı pas, Kahverengi pas, Kara pas
Hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 21-28 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı uygulama yapılmamalıdır.

PATATES
MİLDİYÖ: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-12 gün aralıklarla uygulama yapılır.
ADİ UYUZ: Patates dikiminden önce tohum uygulaması şeklinde yapılır.

ASPIR YAPRAK LEKESİ: Bitkilerde ilk belirtiler görüldüğü zaman uygulamaya başlanır.

KARANFİL PASI: Çelikler üretim alanına şaşırtılmadan önce uygulamaya başlanmalı ve ürünün etki süresi dikkate alınarak uygulamalar tekrarlanmalıdır.

ŞERBETÇİOTU MİLDİYÖ: İlkbaharda sürgünler ortalama 75-100 cm olduğunda uygulamaya başlanır. Çiçek dönemine kadar birer hafta ara ile tekrarlanır. Bu dönemde koza tutma dönemine kadar 10 ar gün aralıklarla devam edilir.

YERFISTIĞI YAPRAK LEKESİ: Uygulamaya hastalığın her yıl görüldüğü yerlerde ekimden 4-5 hafta sonra başlanır, hasada kadar devam edilir.

CEVİZ ANTRAKNOZU:
1 UYGULAMA: Tomurcukların yeni patlamaya başladığı, yaprakların kedi kulağı olduğu dönemde,
2.UYGULAMA: Yapraktaki, yaprakçıkların yarı büyüklüğünü aldığı dönemde,
3.UYGULAMA: Meyvelerin fındık büyüklüğünü aldığı dönemde,
4. Ve diğer UYGULAMALAR meteorolojik koşullar ve kullanılan fungusitin etki süresi dikkate alınarak 10 gün aralıklarla yapılmalıdır

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:
DİKOTAN M-22 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup **M3** olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **DİKOTAN M-22** 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip **(Grup M3)** bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Bakırlılar hariç, diğer Bitki Koruma Ürünleri ile karıştırılabilir. Tereddüt halinde fiziksel karışabilirlik testi yapılmalıdır.

KORUMA

KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DİKOTAN® M-22

ISLANABİLİR TOZ(WP)

GRUBU	M3	FUNGİSİT(MANTAR İLACI)

% 80 Maneb

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇISI:
KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Deniz Mah.Petrol Ofisi Cad.No: 43
DERİNCE/KOCAELİ
Tel : (0262)239 22 70 (2 hat)
Fax :(0262)229 33 24

®= KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TIC AŞ. 'nin ticari markasıdır.

Ünet SAZAK
Zir. Müh.

KORUMA KLOR ALKALİ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No:43 Derince/KOCAELİ Tepecik V.D. 564 000 7582 Tic. Sic. No: Derince 419

23 Ekim 2017
GIDA TARİMİ ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V