

İmal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son kullanma tarihi : (" ")
Şarj No (Damga ile) :
Ruhsat Tarih ve No : 20.10.2011 & 8433



KORUMA Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş.

DENSKA®

Süspansiyon Konsantre (SC)

Net Miktarı (kg veya lt) :
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER	Deltamethrin
-------------	--------------



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P391 Döküntüleri toplayın.
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.
- Ürünü kendi ambalajında, kapalı olarak, yem ve gıda maddelerinden uzakta, kilitli, iyi havalandırılan, güneş ve rutubetten uzakta muhafaza ediniz.
- Tavsiyelere uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.
- Boş ambalajları başka bir gaye için kullanmayınız ve usulüne uygun imha ediniz.

KULLANILACIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR			
BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
NAR	Akdeniz meyvesineği (<i>Ceratis capitata</i>)	90 ml Denska + 200 ml hidrolize protein / 10 litre su(Kısmi dal ilaçlaması)	3 gün
ŞEFTALİ	Akdeniz meyvesineği (<i>Ceratitis capitata</i>)	90 ml Denska + 200 ml hidrolize protein / 10 litre su(Kısmi dal ilaçlaması)	10 gün
NEKTARIN	Akdeniz meyvesineği (<i>Ceratitis capitata</i>)	90 ml Denska + 200 ml hidrolize protein / 10 litre su(Kısmi dal ilaçlaması)	10 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılmalıdır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

GRUBU	3A	İNSEKTİSİT (BÖCEK İLACI)
-------	----	--------------------------

15.7 g/L Deltamethrin

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Deri ve göz ile temasından kaçınınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya ilaç bitki üzerinde kuruduktan sonra girilmesinde bir sakınca yoktur.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Mukozayı tahriş eder. Hapşırma ciltte yanma yapabilir. Ayrıca bulantı, kusma ve baş ağrısına sebep olabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.

Yutma Ağız suyla iyice çalkalayın. Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alın. Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın.

Cilt teması Su ile yıkayın.

Göz teması Su ile yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Spesifik antidotu yoktur. Semptomatik tedavisi uygulanır. Acil durumda hastalığın şiddetine ve hastalığın ağırlığına göre 10-20 mg. Diazepam (VALİUM) enjekte edilir.

UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) TEL: 114

©= KORUMA Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş.'nin, tescilli markasıdır.

28 Aralık 2017
GIDA TARİHİ VE SAĞLIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



Ünet SAZAK
Ankara Bölge Müdürü
KORUMA Klor Alkali
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Deniz Mah. Petrol Ofisi Çad.
No:43 Beşiktaş KOCAELİ
Tic. Sic. No: 564 000 7582
Tic. Sic. No: Derince 419

A
N

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Meyvelerin olgunlaşmadan önce mutlaka tuzak asılarak Akdeniz meyve sineği çıkışı kontrolü yapılmalıdır. Sineğin tespitinden sonra meyveler vurma olgunluğuna erişmişse (dipten itibaren sararma başlamışsa) ve sıcaklıklar 16 °C'nin üzerindeyse derhal ilaçlamaya geçilir. İlaçlamayı takiben tuzaklarda yine sinek görülüyorsa 7-10 gün ara ile hasada 10 gün kalıncaya kadar ilaçlamaya devam edilir. Günlük ortalama sıcaklıklar 16 °C'nin altına düştüğünde ilaçlama gerekmez.

• Zehirli Yem Kısmi Dal İlaçlama yöntemi kullanılır; Hazırlanan cezbedici + insektisit karışımı ağaçların güney tarafındaki meyveli büyük bir dala (1-2 m²lik alan) yapraklar iyice ıslanacak şekilde uygulanır. Zerrecikler yaprakların üzerinde belirgin olarak kalmalıdır. Ağaç başına ortalama 100 ml ilaçlı karışım uygulanır. Birinci ilaçlamada ağaçların bir sırası ilaçlanır, bir sırası atlanır. İkinci ilaçlamada ise birinci ilaçlamada ilaçlanmayan sıralar ilaçlanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

DENSKA adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için DENSKA'nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3A) bitki koruma ürününün kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Bu ürün sadece Akdeniz Meyve sineğinde kullanıldığından kısmi dal uygulamasında Hidrolize protein ile karıştırılarak kullanılabilir.



KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC. A.Ş

DENSKA®

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	3A	İNSEKTİSİT (BÖCEK İLACI)
-------	----	--------------------------

15.7 g/L Deltamethrin

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile üretilen ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

İMALATÇISI FİRMA:

DIACHEM S.p.A.
24061 Albano S.A. (BG)Italy-Via Tonale

RUHSAT SAHİBİ VE PAZARLAYICI FİRMA

KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Deniz Mah.,Petrol Ofisi Caddesi No:43
Derince/KOCAELİ
Tel : (0 262)239 22 70 (2 HAT)
Fax : (0 262) 229 33 24

Ünet SAZAK
Ankara Bölge Müdürü
KORUMA KLOR ALKALİ
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Deniz Mah., Petrol Ofisi Cad.
No:43 Derince/KOCAELİ
Tepeci Mah. 864 000 7582
Tic. Sic. No: Derince 419

28 Aralık 2017
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Y. Bayraktar
Genel Müdürü
T.C. GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A N