

İmal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son kullanma tarihi : (" " " " " " " ")
Şarj No: (Damga ile) :
Ruhsat tarih ve no'su : 04.08.2010 & 7909



KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC. A.Ş.

FLUBALA® 25 EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUBU	F1,12	HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)
250 g/L Flurochloridone		

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç birşey yemeyiniz,

içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

ilaçlanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği

şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE

YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının içine ¼'üne kadar

temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama

tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Özel bir zehirlenme belirtisi yoktur. Genel belirtiler başlangıçta

mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishaldir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes

alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Yaka, kravat

veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Belirtiler ciddi

veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.

Yutma Ağızı suyla iyice çalkalayın. Kendinizi iyi hissetmezseniz,

tıbbi tavsiye/müdahale alınız. Sağlık personeli tarafından

belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın.

Cilt teması Su ile yıkayın.

Göz teması Hemen bol su ile yıkayın. Gözlerinizi ovmayın.

Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15

dakika yıkamaya devam edin ve tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ:

Mide muhteviyatının solunum yollarına kaçmamasına özen

göstererek mideyi yıkayınız. Sonra semptomatik tedavi

uygulayınız. Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi

uygulanır.

UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) TEL: 114

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BITKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR		
BITKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ
AYÇİÇEĞİ	Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	300 ml/da Ekimden hemen sonra (çıkışı öncesi)
	Yabani turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>)	
	Sirken (<i>Chenopodium album</i>)	
	Kırmızı çiçekli ballıbabı (<i>Lamium purpureum</i>)	
	Çoban değneği (<i>Polygonum aviculare</i>)	
	Yabani fiğ (<i>Vicia spp.</i>)	
	Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>)	
	Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	
	Kuş otu (<i>Stellaria media</i>)	
	Fare kulağı (<i>Anag. Ilis arvensis</i>)	
HAVUÇ	Horoz İbîği (<i>Amarantus albus</i>)	250 ml/da Ekimden hemen sonra havuç toprak yüzüne çıkmadan önce
	Semiz Otu (<i>Portulaca oleracea</i>)	
	Çoban değneği (<i>Polygonum aviculare</i>)	
	Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>)	
	Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	
	Yabani turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>)	
PATATES	Sirken (<i>Chenopodium album</i>)	200-250 ml /da Dikimden sonra en geç 5 gün içinde (hafif topraklarda düşük, ağır topraklarda yüksek doz kullanılır.)
	Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	
	Yeşil Horoz İbîği (<i>Amaranthus viridis</i>)	
	Çoban çantası (<i>Capsela bursa pastoris</i>)	
	Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>)	
	Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	
	Gelincik (<i>Papaver rhoeas</i>)	
	Semiz Otu (<i>Portulaca oleracea</i>)	
	Sirken (<i>Chenopodium album</i>)	
	Hakiki şahtere (<i>Fumaria officinalis</i>)	

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

02 Kasım 2018

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARİT EDİLMİŞTİR



Net Miktarı (kg veya lt) :
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER	Flurochloridone, Ksilen
-------------	-------------------------



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

H361 Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P202 Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.

P210 Isıdan/ kıvılcımdan/ alevden/ sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P403+P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

Ünet SAZAK
Ankara Bölge Müdürü

KORUMA KLOR ALKALİ
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Deniz Mah. 1. Sıra No: 1151 Cad.
No: 43 D. No: 1. KOCAELİ
Tepecik Yö. 5. Blok 000 7592
Sic. No: Derince 419

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

FLUBALA 25 EC ay çiçeği ve havuçta ekimden hemen sonra (1-2 gün içerisinde) patateste dikimden sonra en geç 5 gün içerisinde toprak yüzeyine uygulanmalıdır. **FLUBALA 25 EC**'den en yüksek etkiyi almak için ekimden veya dikimden önce toprak keseksiz olarak hazırlanmalıdır. **FLUBALA 25 EC**; çıkmış yabancı otlara etkili olmadığından uygulama sırasında tarlada çıkmış yabancı ot bulunmamalıdır. **FLUBALA 25 EC** uygulandıktan sonra ilaçlı tabakanın bozulmaması için zorunlu olmadıkça toprak işlenmemelidir. Patateste geniş yapraklı yabancı otlara karşı çıkış öncesi olarak hafif topraklarda düşük (200 ml/da), ağır topraklarda yüksek doz(250 ml/da) kullanılmalıdır. Uygulama yelpaze şeklinde uygulama yapan (tee jet) meme ile 2,0-2,5 bar basınçla yapılmalıdır. Uygulama rüzgarsız havalarda yapılır. Uygulama yapılırken aynı yerden üst üste geçilmemelidir. Havuç tohumlarının çimlenmesi için sulama gerekli ise uygulamadan hemen sonra yağmurlama sulama yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

FLUBALA 25 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup **F1,12** olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **FLUBALA 25 EC** 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup **F1,12** harici) diğer bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.



KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC. A.Ş.

FLUBALA® 25 EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUBU	F1,12	HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)
-------	-------	-----------------------------

250 g/L Flurochloridone

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Anılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.
- Boş ürün ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız.
- Diğer ilaçlardan, gübrelere ve tohumlardan uzakta kendi ambalajında, ağzı kapalı olarak serin ve iyi havalanabilen depolarda muhafaza edilmelidir.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile üretilen ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA:

KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
DENİZ MAHALLESİ, PETROL OFİSİ CADDESİ, NO: 43
Derince-KOCAELİ
Tel : (0262)239 22 70 (2 hat)
Faks:(0262)229 33 24

@= KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC AŞ. 'nin tescilli markasıdır

Ünet SAZAK
Ankara Bölge Müdürü

KORUMA KLOR ALKALİ
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad.
No:43 Derince-KOCAELİ
Tic. Sic. No: 567 000 7582
Tic. Sic. No. Derince 419



02 Kasım 2018

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

BS N