

Net Miktarı (kg veya lt) :
Azami perakende satış fiyatı :
İmal Tarihi :
Son kullanma tarihi :
Şarj No :
Ruhsat tarih ve no :10.07.2009/7046

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR			
BİTKİ ADI	ZARARLI ADI	KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE(PHI)
Pamuk	Kırmızı örümcekler (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	100 ml / da (Yumurta, larva, nimf)	--
	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	75 ml/da (Larva,nimf)	--
Sebze (Patlıcan)	Kırmızı örümcekler (<i>Tetranychus spp.</i>)	50 ml / 100 l su (Yumurta, larva, nimf)	1 gün
Elma	Avrupa Kırmızı Örümceği (<i>Panonychus ulmi</i>)	50 ml / 100 lt su (Yumurta, larva, nimf)	7 gün
Bağ*	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 ml / 100 lt su (Yumurta, larva, nimf)	7 gün
Domates (Sera)	İki noktalı Kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	100 ml / 100 l su (Ergin,larva, nimf)	3 gün
Hıyar (Sera)	İki noktalı Kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	100 ml / 100 l su (Ergin, larva, nimf)	3 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılmaz.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLAMA ŞEKLİ :

Önce ilaçlama aletinin deposunu yarıya kadar suyla doldurunuz. Gerekli miktarda ilacı ayrı bir kaptaki bir miktar suyla iyice karıştırılarak aletinin deposuna boşaltılır. İlaçlama aletinin karıştırma düzeni devamlı çalıştırılarak, depo seviyesine kadar kalan su miktarı ilave edilir. İlaçlı mahsul bekletilmeden kullanılmalıdır. İlaçlamaya başlamadan evvel memelerin düzgün çalıştığından emin olunuz. Uygulama sabahleyin veya akşam üzeri havanın çok sıcak olmadığı zamanlarda yapılmalıdır.

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.



KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KINGSOR® 5 EC

AKARİSİT (KIRMIZI ÖRÜMCEK İLACI)
EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

Etkili madde :Litrede 50 gram Hexythiazox içerir.
(4RS,5RS)-5-(4-chlorophenyl)-N-cyclohexyl-4- methyl-2-oxo-1,3-thiazolidine-3-carboxamide

GRUBU	10A	AKARİSİT
-------	-----	----------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ. ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE / VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ,İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.
KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ.BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Karakteristik bir zehirlenme belirtisi görülmez.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ

İlaçla bulaşık elbiseleri çıkartın.Deriyle teması halinde bol su ve sabunla yıkayın.Gözlere bulaşması halinde en az 15 dakika boyunca bol suyla yıkayın ve tıbbi yardım sağlayın.Yutulması halinde bir bardak suya bir çorba kaşığı tuz katılarak hazırlanan tuzlu su içirilmek yada veya parmakla boğazın gerisine bastırılmak suretiyle hastayı kusturun.Hastayı temiz havaya çıkartın ve tıbbi yardım sağlayın.

ANTİDOTU:

Özel bir antidotu yoktur, belirtilere göre tedavi uygulanır.

UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) TEL : 114
SADECE ZEHİRLENME DURUMUNDA ARAYINIZ.

13 Mayıs 2016

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

TEHLİKE ÖZELLİĞİ / İŞARETİ:



Xn:Zararlı

N : Çevre için tehlikeli

İÇİNDEKİLER

Hexythiazox,
ksilen,sikloheksanon

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

R10: Alevlenir.

R20/21:Cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R 38:Cildi tahriş eder.

R41:Gözde ciddi hasar riski.

R50/53 :Sucul organizmalar çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

S1/2 : Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S24 : Cilt ile temasından sakının.

S26 :Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

S28: Cilt ile temasında derhal bol su ve sabun ile iyice yıkayın.

S29/56 : Kanalizasyon sistemine boşaltmayın.Atığını ve kabını güvenli bir biçimde bertaraf edin.

S36/37/39:Uygun koruyucu giysi,koruyucu eldiven,koruyucu gözlük/maske kullanın.


S45:Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurunuz .(mümkünse etiketi gösteriniz)

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı ve etiketi gösterin.

S60: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak imha ettirin.

S 61 : Çevreye salıverilmesinden kaçının.Özel kullanım talimatına/Güvenlik Bilgi formuna başvurun.

KORUMA KLOR ALKALİ
Sakarya Tarım A.Ş.
Deniz Mahallesi, 1. Etaj Katı
No : 10000000000000000000
Tic. Sic. No: 26440000000000000000
Tic. Sic. No: 26440000000000000000



Pamukta kırmızı örümcek : Tarla kenarında ve içinde yapılan kontrollerde Akdeniz bölgesinde 5 birey/yaprak, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 10 birey/yaprak yoğunluğa ulaştığında kaplama ilaçlama yapılır.

Bağda Kırmızı örümcek : Yapılan sayımlarda 5-8 adet canlı birey/yaprak olduğunda ilaçlama yapılır.

Elmada kırmızı örümcek : Mayıs ayından itibaren 100 yaprakta yapılan sayımlarda 8-10 adet canlı birey/yaprak olduğunda ilaçlama yapılır.

Patlıcanda kırmızı örümcek : Rastgele seçilen bitkilerde bitkinin alt ve orta yapraklarından dekar başına 10 yaprakta sayım yapılır. Yaprak başına en az 5 canlı birey bulunduğu ilaçlama yapılır.

Domateste iki noktalı kırmızı örümcek : Rastgele seçilen bitkilerde bitkinin alt ve orta yapraklarından dekar başına 10 yaprakta sayım yapılır. Yaprak başına en az 5 canlı birey bulunduğu ilaçlama yapılır.

UYGULAMA ŞEKLİ

Her türlü püskürtücü ile yerden uygulanabilir. Tarla pülverizatörleri ile ilaçlama yapılırken yaprak altlarının da ilaçlanabilmesi için sıra arası memelerin takılması ve kaplama ilaçlama yapılması tavsiye edilir.

Meyve ağaçlarında genellikle çiçek taç yapraklarının tamamen dökülmesinden sonra birinci ilaçlama yapılmalı,yoğunluk olduğu takdirde tekrarlanmalıdır.

Erginlerde etkisi düşük olduğundan ergin popülasyonu çoğalmadan ilaçlamaya başlanmalıdır.Eğer ergin popülasyonu fazla ise erginlere etkili kontakt bir akarisit karıştırılarak uygulanması tavsiye edilir.

Kırmızı örümceklerin direnç kazanmalarını önlemek için Kingsor 5 EC ile yılda iki defadan fazla ilaçlama yapmayınız.Klasik akarılara ve direnç kazanmış akarılara da etkilidir.Yağmurla yıkanmaya dayanıklıdır.Etkisi 50-60 gün sürer.Kırmızı örümceklerin larva ve nimfleri ilaçla temas ettiklerinde veya ilaçlanmış bitki yapraklarına dokunduklarında ölürlür.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

KINGSOR 5 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup **10A** olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **KINGSOR 5 EC** 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup 10A harici**) zararıya karşı ruhsat almış diğer bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Kuvvetli alkali ilaçlar hariç yaygın akarisit, fungusit ve yaparak gübrelere karıştırılarak kullanılabilir.



KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KINGSOR® 5 EC

AKARİSİT (KIRMIZI ÖRÜMCEK İLACI)

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

Etkili madde :Litrede 50 gram Hexythiazox içerir.

(4RS,5RS)-5-(4-chlorophenyl)-N-cyclohexyl-4- methyl-2-oxo-1,3-thiazolidine-3-carboxamide

GRUBU	10A	AKARİSİT
-------	-----	----------

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara ,kuşlara ve balıklara az zehirlidir.
- Faydalı böcekleri etkilemez.
- Temas ve mide yoluyla etkilidir.
- Tavsiyeye uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.
- İlacı serin.kuru ve iyi havalanabilen yerlerde muhafaza ediniz.
- İlacı kendi ambalajında , ağız kapalı olarak saklayınız.
- Boş ilaç ambalajlarını atık tasfiyesinin tehlike oluşturmayacağı bir yerde, yakma yoluyla veya başka bir uygun yöntemle imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

İMALATÇISI VE RUHSAT SAHİBİ:

KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİCARET A.Ş.

Deniz Mah.Petrol Ofisi Cad.No:43

DERİNCE/KOCAELİ

Tel : (0 262) 239 22 70 (2 hat)

Fax: (0 262) 229 33 24

®= KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TIC AŞ. 'nin tescilli markasıdır.



13 Mayıs 2016

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.

