

Net miktarı :  
Azami perakende satış fiyatı(KDV'li) :  
İmal Tarihi :  
Son kullanma tarihi :  
Şarj No: (Damga ile) :  
Ruhsat tarih ve no'su :

| KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR |  |                 |   |
|-----------------------------------|--|-----------------|---|
| BİTKİ ADI                         | HASTALIK ADI                               | KULLANMA DOZU   | SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE(GÜN) |
| Elma                              | Karaleke<br>( <i>Venturia inaequalis</i> ) | 40 ml /100 L su | 28 gün                                      |
| Armut                             | Karaleke<br>( <i>Venturia pirina</i> )     | 40 ml /100 L su | 28 gün                                      |

**KORANİL 500 SC** elma karalekesi ve armut karalekesi hastalığına karşı kullanılan sistemik bir fungisitir.**KORANİL 500 SC** koruyucu ilaçlamalar olarak kullanılmaktadır.

**ETKİ ŞEKLİ** : **KORANİL 500 SC** , methionine biosentezini etkileyerek hastalığı kontrol eder.(Ergosterol biosentezine müdahale etmez.)Hastalık amili mantarların özellikle bitkiye nüfus etmeleri esnasında ve bitki dokularında misellerinin gelişmeleri safhalarında müdahalede bulunur.**KORANİL 500 SC** yapraklarından iyi ve hızlı bir şekilde bitki bünyesine alınır.İlaç bitkide hem aşağıdan yukarı doğru ve hemde yaprakların bir yüzünden diğer yüzüne taşınır.Yukarıdan aşağıya doğru taşınma durumu (basipetal) görülmemiştir.

**İLACIN UYGULAMA ŞEKLİ** : İlaçlama meyvede tazyikli pulverizatörler ile ağaçların her tarafını ilaçları mahlül ile temas edecek şekilde yapılmalı , ancak ilacın yapraklardan yıkanarak uzaklaşmasına izin verilmemelidir.

#### KALİBRASYON:

İlaçlamadan önce ilaçlama aletinin tüm memelerinin çalıştığı ve birim zamanda aynı miktarda sıvı püskürtüp püskürtmediği memelerin altına konulacak bir kaptaki birim zamanda biriken suyun her meme için aynı olup olmadığı kontrol edilir ve aynı olması sağlanır.İlaçlama aletinin tankı ilaçsız su ile doldurulur.İlaçlama yapar gibi belli bir hızla gidilerek belli bir alandaki bitkiler ıslatılır.Harcanan su miktarı belirlenerek ağaç başına harcanacak su miktarı belirlenir.

KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC.A.Ş.

# KORANİL® 500 SC

FUNGİSİT (MANTAR İLACI)  
SUSPANSİYON KONSANTRE(SC)  
ETKİLİ MADDE: Litrede 500 gram Cyprodinil içerir.  
[4-cyclopropyl-6-methyl-N-phenylpyrimidin-2-amine]

GRUBU D1,9 FUNGİSİT (Mantar İlacı)

**ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.**  
**EVDE KULLANMAYINIZ. ÇOCUK-LARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.**  
**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE / VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ. MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.**  
**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ,SİĞARA KULLANMAYINIZ. DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.**  
**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.**  
**İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.**  
**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.**  
**KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ.ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.**

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ** :Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.  
**EMNİYET İLE İLGİLİ HUSUSLAR** :

İlaç cilt, göz ve giyeceklerinizle temas ettirmeyin.Şayet rahatsızlık hissedilirse derhal işi bırakınız ve ilkyardım tedbirlerini alınız.İş tulumu, şapka, sağa ayakkabı,siperlik , gözlük ve eldiven gibi iş giyeceklerinizi kullanınız.İş bittikten sonra tüm elbiselerinizi ve ekipmanlarınızı yıkayınız.İlaçlamadan sonra herhangi bir şey yemeden önce el ve yüzünüzü yıkayınız.

#### İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Zehirlenmeden şüpheleniliyorsa eğer derhal işi bırakınız ve doktor çağırınız.Deriye teması halinde bol su ile yıkayınız.İlaç gözlerinize gelmiş ise gözlerinizi 10-15 dakika süre ile bol su ile yıkayınız.İlaç solunmuşsa temiz havaya çıkınız.Mide yoluyla alınmış ise doktor çağırınız veya ilaç ambalajı ve etiketi ile derhal doktora gidiniz.  
**NOT** : Baygın hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyiniz.  
Gerektiğinde Ulusal Zehir Danışma Merkezinin ücretsiz telefonu 114'ten arayınız.

#### ANTİDOTU VE TEDAVİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER:

Spesifik bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulayınız.

**UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ)TEL : 114 SADECE ZEHİRLENME DURUMUNDA ARAYINIZ.**

TEHLİKE ÖZELLİĞİ / İŞARETİ:



Xn : Zararlı N : Çevre için tehlikeli

İÇİNDEKİLER Cyprodinil

**UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :**

**R43:**Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

**R50/53:** Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

**GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI**

**S2:** Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

**S29/56:** Kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin.

**S36/37/39:** Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

**S45:** Kaza durumunda yada kendinizi iyi hissetmezseniz, acil olarak tıbbi yardım alın.

**S46:** Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

**S60:** Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.

**S61:**Çevreye salıverilmesinden kaçınınız.Özel kullanım talimatına/ Güvenlik Bilgi formuna başvurun.

**KORUMA KLOR ALKALİ**  
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  
Deniz Mülkiyetleri Genel Müdürlüğü  
No: 42/2015-2016/2016/2016  
Tepebaşı, D.Ş. 064 000 7582  
Tic. Sic. No: Darıca 419

24 Ağustos 2015

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KARAR EDİLMİŞTİR.



KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC.A.Ş.

# KORANİL® 500 SC

**FUNGİSİT (MANTAR İLACI)**  
**SUSPANSİYON KONSANTRE(SC)**  
**ETKİLİ MADDE:** Litrede 500 gram Cyprodinil içerir.  
[4-cyclopropyl-6-methyl-N-phenylpyrimidin-2-amine]

| GRUBU | D1,9 | FUNGİSİT (Mantar İlacı) |
|-------|------|-------------------------|
|-------|------|-------------------------|

## DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

**KORANİL 500 SC** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup D1,9 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **KORANİL 500 SC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup D1,9) harici bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

## KARIŞABİLİRLİK DURUMU :

Genellikle yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyve ağaçlarında kullanılan diğer fungusitler ile karışım halinde kullanılabilir.Şüpheli halde uygulamadan önce küçük bir karışılabilirlik testi yapılabilir.Eğer **KORANİL 500 SC** başka ilaçlar ile depo karışımı olarak kullanılacak ise suya ilaçları aşağıdaki sıraya göre koyunuz.

- Önce **KORANİL 500 SC** sonra karışıma giren diğer ilaçlar konur.
- Eğer karışım halinde kullanılacak ilaçlar arasında "suda eriyebilir ambalaj" da bulunanlar var ise önce bunlar , sonra **KORANİL 500 SC** konulur.

## KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

- Suda yaşayan canlılara zehirlidir.Her türlü su kaynaklarını ilaç atıklarının imhası sırasında kirlenmemelidir.
- İlaçlı mahlülün tamamını tarlaya püskürtünüz.
- Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız
- Bekleme süresine uyunuz.
- Boş ilaç ambalajlarını başka gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun bir şekilde imha ediniz.
- Yeni ilaçlanmış sahada hayvan otlatmayınız. Buralardan gıda maddesi ve yem alınmamalı,tüm evcil hayvanlar uzak tutulmalıdır.Gıda ve yem maddeleri ilaçla kirlenmemelidir.

## DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.0°C'nin altında ve + 35 °C'nin üzerinde depolanmaz.

## FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

## FİRMA ADI VE ADRESİ :

### RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇISI :

KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No : 43

Derince-41900 / KOCAELİ

Tel : (0 262) 239 22 70 (2 hat)

Fax: (0 262) 229 33 24

®= KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC AŞ. 'nin tescilli markasıdır

**KORUMA KLOR ALKALİ**  
Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad.  
No: 43 / Derince / KOCAELİ  
Tic. Sic. No: 264 000 7582  
Tic. Sic. No: Derince 419

## İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden bir depo için hesaplanan ilaç önce ayrı bir kaptan bir miktar su ile karıştırılır .İlaçlama aletinin deposunu yarıya kadar su ile doldurup karıştırıcısını çalıştırarak hazırlanmış ilaçlı eriyiği içine dökünüz ve üzerine kalan gerekli su ile tamamlayınız. Hazırlanmış ilacı aynı gün içinde kullanınız.İlaçlama tamamlanmaya kadar karıştırmaya devam ediniz.

## İLAÇLAMA ZAMANI:

### Elmada karaleke:

- 1.ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığı zaman(patlamaya yakın dönemde) ;
- 2.ilaçlama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde(çiçekler kısa sapları ile ayrı ayrı görüldüğünde ) yapılmalıdır.
3. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 döküldüğünde yapılır.
4. ve diğer ilaçlamalar: yağışlar ve ilacın etki süresi (12-14 gün) dikkate alınarak yapılmalıdır.

### Armutta Karaleke :

- 1.ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığı zaman(patlamaya yakın dönemde) ;
- 2.ilaçlama: Beyaz çiçek tomurcuğu döneminde (beyaz rozet döneminde),
- 3.ilaçlama : Çiçek taç yaprakları %70-80 döküldüğünde yapılır.
- 4.ve diğer ilaçlamalar: yağışlar ve ilacın etki süresi (12-14 gün) dikkate alınarak yapılmıştır.

Preparat; "kalıntı oluşmasının" ve "duyarlılık azalışının kontrolü" amacıyla bir üretim sezonunda üst üste olmamak koşuluyla Elma karalekesi ve Armut karalekesi hastalıkları için yukarıda belirtilen mücadele programlarında 2 uygulamadan daha fazla kullanılmamalıdır.

**Bitki Tahammülü:**Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığı zaman tavsiye edildiği kültür bitkileri üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.Tereddüt halinde hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir.

24 Ağustos 2015

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

  
Mustafa BAYRAM  
Daire Başkanı