

İmal Tarihi :
Son kullanma tarihi :
Şarj No: (Damga ile) :
Ruhsat tarih ve no'su : 25.02.1975 & 972



KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC.A.Ş.
KORTİRAM® FORTE 80 WP
İSLANABİLİRTOZ (WP)

Grubu	M:3	Fungisit (Mantar İlacı)
% 80 Thiram		

Net Miktarı (kg veya L) :
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER | Thiram



UYARI KELİMESİ DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H302+H332 Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P301+P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.
P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/ müdahale alın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/ müdahale alın.
P337+P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/ bakım alın.
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

Ünet SAZAK
Ankara Bölge Müdürü

KORUMA KLOR ALKALİ
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Deniz Mh. 11. Etap Ofisi Cad.
No:43 Beşiktaş-KOCAELİ
Tic. Sic. No: 564 000 7582
Tic. Sic. No: Derince 419

KULLANILACIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR			
BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDA Kİ SÜRE
Fasulye	Kök Çürüklüğü (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Macrophomina phaseoli</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Macrophomina phaseoli</i> .)	300 g/100 L su	14 gün
Armut	Karaleke (<i>Venturia prina</i>)	150 g/100 L su	14 gün
Elma	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>)	150 g/100 L su	14 gün
Erik	Cep Hastalığı (<i>Taphrina pruni</i>)	300 g/100 L su	14 gün
Fındık	Fındık Faresi (<i>Mucardinus sp.</i>) Yedi Uyur (<i>Glis glis</i>) kaçıncı repellent olarak	4 kg /100 L su	14 gün
Fidan Ve Omcalarda	Ada Tavşanı (<i>Oryctolagus cuniculus</i>) Tarla Tavşanı (<i>Lepus europaeus</i>) Kaçıncı Repellent olarak	150 g/1 L suya	--
Kavun, Karpuz	Kabakgillerde Antraknoz (<i>Colletotrichum lagenarium</i> ,)	300 g/100 kg tohum	--
Kayısı	Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa</i>)	200 g/100 L su	14 gün
Kiraz	Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa</i>)	150 g/100 L su	14 gün
Nohut	Antraknoz (<i>Ascochyta rabiei</i>)	300 g/100 kg. tohum	--
		200 g/100 L. su Yeşil aksam ilaçlaması	14 gün
Sebzeler	Sebzelerinde Çökerten ve kök Çürüklüğü (<i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Phythium spp.</i> , <i>Fusarium spp.</i> , <i>Sclerotonia spp.</i> , <i>Alternaria spp.</i>)	200 g/100 kg tohum 200 g/100 L su (Yeşil aksam ilaçlaması)	--
Soğan	Sürme (<i>Urocystis cepulae</i>)	5 kg/100 kg Arpacık tohum	--

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız. Deri ve göz ile temasından kaçınınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız. İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım talimatına uyunuz.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Solunum yollarının açık kalmasını sağlayın. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Solunum zorluğu ekildiğinde, uygun eğitilmiş personel tarafından kazazedeye oksijen verilebilir. Tıbbi yardım alın. Bilinci yerinde olmayan kişiyi ilk yardım pozisyonunda yan tarafına yatırın ve solunumun gerçekleşebilmesini sağlayın.

Yutma Ağzı suyla iyice çalkalayın. Birkaç bardak su veya süt içirin. Kusma tehlikeli olabileceğinden dolayı, kazazede kendini rahatsız hissederse kusmayı durdurun. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Bilinci yerinde olmayan kişiyi ilk yardım pozisyonunda yan tarafına yatırın ve solunumun gerçekleşebilmesini sağlayın. Kazazedeyi gözlem altında tutun. Tıbbi yardım alın.

Cilt teması Ciltte kalan parçaları temizleyin. Maddenin hemen cildin üzerinden alınması önemlidir. Gelişmekte olan herhangi bir hassasiyet belirtisi durumunda, daha fazla maruziyetten kaçınılmalıdır. Kirliliği sabun ve suyla veya bilinen cilt temizleyici bir madde ile temizleyin. Yıkamanın ardından belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.

Göz teması Su ile yıkayın. Gözlerinizi ovmayın. Kontakt lens varsa çıkarın.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidötu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

02 Ocak 2018

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR			
Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
Şeftali	Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (<i>Wilsonomyces carpophylus</i>)	300 g/100 L su	14 gün
	Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa</i>)		
Şekerpancarı	Çökerten (Kök yanıklığı) (<i>Phoma betae</i>)	400 g/100 kg tohum	--
Tütün	Fidelerde çökerten (<i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Phythium spp.</i> , <i>Fusarium spp.</i> , <i>Sclerotinia sclerothnum.</i> , <i>Alternaria spp.</i>)	200 g/100 L su veya 2,5-3 g/m ³	14 gün
Hıyar (Sera)	Sebze fidelinde Çökerten ve Kök Çürüklüğü (<i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Phythium spp.</i> , <i>Fusarium spp.</i> , <i>Sclerotinia spp.</i> , <i>Alternaria spp.</i>)	200 g/100 kg tohum (Fidelikte Tohum ilaçlaması)	--



KORUMA Klor Alkali San. ve Tic.A.Ş.
KORTİRAM® FORTE 80 WP
 ISLANABİLİRTOZ (WP)

Grubu	M:3	Fungisit (Mantar İlacı)
		% 80 Thiram

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında kullanmayınız.
- Ürünü, orijinal ambalajında ağzı kapalı olarak yem ve gıda maddelerinden ayrı, kilitli, iyi havalandırılan, kuru ve serin yerlerde muhafaza ediniz. + 35°C'nin üzerinde depolamayınız.
- Boş ürün ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Tavsiye edilen bitki ve dozda tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında fitotoksik değildir.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiiksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

Ünet SAZAK
 Ankara Bölge Müdürü

KORUMA Klor Alkali
 Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 Deniz Mah. Akmerkez B1 Blok Kat: 5
 No: 43 D Blok Kat: 5 KOCAYOLU
 Tepecik / D. 064 000 7582
 Tic. Sic. No: Derince 419

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılmalıdır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
 GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 KABUL EDİLMİŞTİR

02 Ocak 2018



BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:
FASULYE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ

Ekimden önce koruyucu olarak tohum uygulaması önerilebilir. Uygulanacak tohum hafifçe nemlendirildikten sonra bitki koruma ürünü ilave edilmeli ve ürünün tohuma iyice yapışmasını sağlayacak şekilde karıştırılmalıdır. Karıştırma işlemi sırasında tohum kabuğunun soyulmasına meydan vermemek için bidonu yavaş çevirmek gerekmektedir.

ARMUT KARALEKESİ:

1. **Uygulama:** Çiçek gözleri kabardığında (dal sırcası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. **Uygulama:** Beyaz rozet döneminde
3. **Uygulama:** Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
4. **Ve diğer uygulamalar:** İklim koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün ara ile yapılır.

ELMA KARALEKESİ:

1. **Uygulama:** Çiçek gözleri kabardığında (dal sırcası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. **Uygulama:** Pembe rozet döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
3. **Uygulama:** Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
4. **Ve diğer uygulamalar** ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünlerin etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

ERİK CEP HASTALIĞI:

1. **Uygulama** tomurcukların kabardığı dönemde
2. **Uygulama** çiçek taç yapraklarının % 80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.

YEDİ UYUR:

Fındıkların süt olum devresinden itibaren zararı görülür görülmez uygulamaya başlanır.

TARLA VE ADA TAVŞANINA KARŞI:

Tavşanlar tarafından kemirilen fidan ve omçaların toprak seviyesinden 1 m yüksekliğe kadar olan kısımlarına uygulama yapılır. Uygulama pülverizatör veya fırça ile yapılabilir. Uygulama yapıldığı günün akşamı don olayının vukua gelmemesi ve uygulama yapıldığı sırada ağaçların ıslak olmaması gerekmektedir.

KABAKGİLLERDE ANTRAKNOZ (KAVUN-KARPUZ):

Tohum uygulaması: Ekimden önce tohumlar 1 saat süreyle ıslatılıp, 1 saat kurutulduktan sonra uygulanmalıdır.

Yeşil aksam uygulaması: Günlük ortalama sıcaklığın 16 C olması ve ortalama nemin %80'e ulaşması ile mücadeleye başlanması gerekirse de; uygulamada en pratik yol, çevrede kavun-karpuz bitkilerinin yaprak ve saplarında ilk antraknoz lekelerinin tespiti ile uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir.

SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE ÇİÇEK MONİLYASI (KAYISI, KIRAZ VE ŞEFTALİ)

1. **Uygulama:** Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte)
2. **Uygulama:** Tam çiçeklenme (%90-100 çiçekte) yapılır.



KORUMA Klor Alkali San. ve Tic.A.Ş.
KORTİRAM® FORTE 80 WP
ISLANABİLİRTOZ (WP)

Grubu	M3	Fungisit (Mantar İlacı)
		% 80 Thiram

Ünet SAZAK
Ankara Bölge Müdürü
KORUMA Klor Alkali
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Deniz Mh. Çayır Oflisi Cad.
No:47 Beyneç-KOCAELİ
Tepelik V.D. 564 000 7582
Tic. Sic. No: Derince 419

02 Ocak 2018
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR



NOHUT ANTRAKNOZU:

Tohum uygulaması: Ekimden 3-4 saat önce nohut tohumları bir saat süreyle su içerisinde ıslatıldıktan sonra yarım saat süreyle bir sergi üzerine serilerek havalandırılmalı ve gerekli miktar bitki koruma ürünü ile karıştırılarak ekilmelidir.

Yeşil aksam uygulaması: uygulamaya günlük ortalama sıcaklığın 10 C° ve orantılı nemin en az %80 olması durumunda başlanması gerekirse de, pratik olarak yörede hastalığın ilk belirtileri görülmesi ile başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Uygulamanın yapıldığı gün şiddetli yağış oluşmuşsa uygulama tekrarlanmalıdır.

SEBZE FİDELERİNDE ÇÖKERTEN VE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ (SEBZE FİDELERİ, HIYAR (SERA))

Uygulamalar tohum ve toprak uygulaması şeklinde yapılır.

Tohum uygulaması: Ekimden önce tohumu uygulanır.

Tohum uygulaması: ekimden önce, ekimden sonra fidelerin toprak yüzüne çıkışından sonra ve fidelerin sera veya tarlaya şaşırtılmasından sonra yapılır.

SOĞAN SÜRMEŞİ:

Tohum ürünleri tohumlar hafifçe nemlendirildikten sonra kapalı bir kaptan iyice karıştırılır ve ekilir.

SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE YAPRAK DELEN (ŞEFTALİ):

1. **Uygulama:** Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
2. **Uygulama:** İlbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde)

Kayisılarda ilave olarak meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sınırlı olarak 3. Uygulama yapılmalıdır.

ŞEKERPANCARINDA ÇÖKERTEN (KÖK YANIKLIĞI)

Ekimden önce tohum uygulaması yapılmalıdır.

TÜTÜN FİDELERİNDE ÇÖKERTEN

Tohumlar ekilip kapak gübresiyle örtüldükten sonra veya fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde yapılmalıdır. Hastalık görülür görülmez yapılacak uygulamalar, şaşırtma devresine kadar haftada bir uygulanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

KORTİRAM FORTE 80 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup **M:3** olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **KORTİRAM FORTE 80 WP** 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup **M:3** harici) diğer bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Bir çok fungusit ve insektisit ile karışabilir. Ancak diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi yapılması önerilir. Karışım hazırlandıktan sonra en kısa zamanda kullanılmalıdır. Quinomethionate ve bakırlı fungusitlerle karıştırılmaz. Bitkilere bakırlı ürün uygulanmışsa hemen ardından Thiram etkili maddesi içeren ürün tatbikatı yapılmamalıdır. Bakırlı ürün tatbik edilmişse aradan iki haftalık bir sürenin geçmesi beklenmelidir.



KORUMA Klor Alkali San. ve Tic.A.Ş. KORTİRAM® FORTE 80 WP İSLANABİLİRTOZ (WP)

Grubu	M3	Fungisit (Mantar İlacı)
		% 80 Thiram

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA:

KORUMA Klor Alkali San. ve Tic.A.Ş.
DENİZ MAH.PETROL OFİSİ CAD. NO: 43,41900-
DERİNCEKOCAELİ

Tel : (0262)239 22 70 (2 hat)

Fax : (0262)239 22 78

®= KORUMA Klor Alkali San. ve Tic AŞ. 'nin ticari arkasıdır.

Ünet SAZAK
Ankara Bölge Müdürü

KORUMA Klor Alkali
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad.
No:43 Derince KOCAELİ
Tepecik V.D. 864 000 7582
Tic. Sic. No: Derince 419

02 Ocak 2018

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

