

İmal Tarihi :
Son kullanma tarihi :
Şarj No: (Damga ile) :
Ruhsat tarih ve no'su : 16.03.2015& 10146

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR			
Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
BAĞ*	Bağ Mildiyözü (<i>Plasmora viticola</i>)	600 g/100 L su	14 gün
	Ölükol (<i>Phomopsis viticola</i>)	500 g/100 L su (Yaz uygulaması) 3500 g/100 L su (kış uygulaması)	14 gün
ELMA	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>)	1500 g/100 L su	14 gün
KAYISI	Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (<i>Wilsonomyces carpophilus</i>)	625 g /100 L su (Normal dönem) 1250 g/100 L su (Dormant dönem)	14 gün
ŞEFTALİ	Yaprak Kıvrıklığı (<i>Taphrina deformans</i>)	1500 g/100 L su	14 gün
DOMATES	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	600 g/100 L su	14 gün
ZEYTİN	Halkalı Leke Hastalığı (<i>Spilocaea oleaginea</i>)	1.uygulama 1500 g/100 L su 2. uygulama 1000 g/100 L su	14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılmalıdır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda değilse karışım su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamızdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

BAĞ MİLDİYÖ:

- 1.uygulama: Sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır.
- 2.ve sonraki uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortamları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

12 Subat 2018



KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KORUMA BORDOMİX® 20 WP

İSLANABİLİR TOZ (WP)

GRUBU	M:1	FUNGİSİT(MANTAR İLACI)
-------	-----	------------------------

% 20 Metalik Bakır'a eşdeğer Bordo Bulamacı

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış 1 gün süre ile insan ve hayvan ilaçları sahaya giremez. İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım talimatına uyunuz.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

- Ağızda ve boğazda ağrı
- Sulu ve kanlı ishal
- Kan basıncında düşme görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Solunum yollarının açık kalmasını sağlayın. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Solunum zorluğu çekildiğinde, uygun eğitilmiş personel tarafından kazazedeye oksijen verilebilir. Tıbbi yardım alın. Bilinci yerinde olmayan kişiyi ilk yardım pozisyonunda yan tarafına yatırın ve solunumun gerçekleşebilmesini sağlayın.

Yutma Ağız suyuyla iyice çalkalayın. Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alın. Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın.

Cilt teması Ciltte kalan parçaları temizleyin. Su ile yıkayın.

Göz teması Hemen bol su ile yıkayın. Gözlerinizi ovmayın.

Kontakt lens varsa çıkarın

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

- Mide yıkanır.
- Bal, EDTA veya Penicilamine uygulanır.
- Semptomatik tedavi uygulanır.

UZEM (ULUSAL ZEHİR/DANIŞMA MERKEZİ) TEL: 114



Net Miktarı (kg veya lt)
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER	Bordo mixture (Bakır kalsiyum sülfat)
-------------	---------------------------------------



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

H332 Solunması halinde zararlıdır.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklara zehirlidir, su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü, kendi ambalajları içinde rutubetsiz yerlerde muhafaza edilmelidir.
- Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

Ünet SAZAK
Ankara Bölge Müdürü

KORUMA KLOR ALKALİ
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Deniz / Akdeniz / Çarşı / Cad.
No: 43 / 1. Kat / Çarşı
Tepedik / D. 064 000 7582
Tic. Sic. No: 27114 / 419

BAĞ ÖLÜKOL:

Kış uygulaması: Budamadan sonra gözler uyanmadan hemen önce yapılmalıdır.
Yaz uygulaması:

- 1.Uygulama: sürgünler 2-3 cm olduğunda
- 2.Uygulama: sürgünler 8-10 cm olduğunda
- 3.Uygulama: sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

ELMA KARALEKESİ:

- 1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sırcası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
- 2.Uygulama: Pembe rozet döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
- 3.Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
- 4.Ve diğer uygulamalar: İklim koşullarının hastalığının ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan bitki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE YAPRAK DELEN (KAYISI):

- 1.Uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
 - 2.Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde)
- Kayısılarda ilave olarak meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3. Uygulama yapılmalıdır.

ŞEFTALİ YAPRAK KIVIRCIKLIĞI:

Tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır.

DOMATES MİLDİYÖ:

Çevrede domates yapraklarının 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle uygulamaya başlanır.

ZEYTİN HALKALI LEKE:

Marmara Bölgesinde:

- 1.Uygulama: Sonbaharda sürgünler görülmeden hemen önce
- 2.Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce Ege Bölgesinde:

- 1.Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce
- 2.Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Akdeniz Bölgesinde:

- 1.Uygulama: Hasattan sonra
- 2.Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden önce
- 3.Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

KORUMA BORDOMİX 20 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M:1 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **KORUMA BORDOMİX 20 WP** 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M:1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Hiçbir Bitki koruma ürünüyle karıştırılmadan (insektisit, fungusit, bitki gelişim düzenleyicileri vb.) tek başına kullanılmalıdır.



KORUMA Klor Alkali Sanayi ve Ticaret A.Ş.

KORUMA BORDOMİX® 20 WP

İSLANABİLİR TOZ (WP)

GRUBU	M:1	FUNGİSİT(MANTAR İLACI)
-------	-----	------------------------

% 20 Metalik Bakır'a eşdeğer Bordo Bulamacı

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ, ÜRETİCİ FİRMA:

KORUMA Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş.

Deniz Mah.Petrol Ofisi Cad. No: 43

41900 -Derince/KOCAELİ

Tel : (0262)239 22 70 (2 hat)

Fax:(0262)229 33 24

®= KORUMA Klor Alkali San. ve Tic AŞ. 'nin ticari markasıdır

Ünet SAZ
Ankara Bölge Müdürü
KORUMA Klor Alkali
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad.
No:43 Düzce / KOCALİ
Tepecik Yolu No:41 000 7582
Tic. Sic. No: Derince 419



GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

12 Şubat 2018