

İmal Tarihi :  
Son kullanma tarihi :  
Şarj No: (Damga ile) :  
Ruhsat tarih ve no'su : 25.01.2018/11041



KORUMA Klor Alkali Sanayi ve Ticaret A.Ş.

# MAVİ BORDO® 20 WG

SUDA DAĞILABİLEN GRANÜL (WG)

GRUBU M:1 FUNGİSİT (Mantar İlacı)

%20 Metalik Bakıra eşdeğer Bordo Bulamacı

### Önce etiketi okuyunuz

Evde kullanmayınız

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün süre ile insan ve hayvan giremez.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım talimatına uyunuz.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Hızlı soluma, heyecan, baş dönmesi, halsizlik, mide bulantısı, bulanık görme, ağızda madeni bir tat, kanlı ishal, yeşil-mavi renkli kusma.

### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

**Solunum Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin.** Solunum yollarının açık kalmasını sağlayın. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Solunum zorluğu çekildiğinde, uygun eğitilmiş personel tarafından kazazedeye oksijen verilebilir. Tıbbi yardım alın. Bilinci yerinde olmayan kişiyi ilk yardım pozisyonunda yan tarafına yatırın ve solunumun gerçekleşebilmesini sağlayın.

**Yutma Ağız suyu iyece çalkalayın.** Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınız. Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın.

**Cilt teması Su ile yıkayın.**

**Göz teması Hemen bol su ile yıkayın.** Gözlerinizi ovmayın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin ve tıbbi yardım alın.

### ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:


Genel durum değerlendirilmesi yapıp, belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır. Mide boşaltılmalıdır. Bal, EDTA veya Penisilamin verilebilir.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)TEL: 114

Net Miktarı (kg veya L)  
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER

Bordo mixture, Sodium  
C12-18 Lauryl Sulphate



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

### ZARARLILIK İFADELERİ

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

H332 Solunması halinde zararlıdır.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

### ÖNLEM İFADELERİ

P261 Tozunu solumaktan kaçının.

P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

Ünet SAZAK  
Ankara Bölge Müdürü

KORUMA Klor Alkali  
Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Derinlikler Mahallesi 0161 Cad.  
No: 43/10066-KOCAELİ  
Tic. Sic. No: 264 000 7582  
Tic. Sic. No: Derince 419

| KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR |                                                                                |                                                                             |                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Bitki Adı                                   | Zararlı Organizma Adı                                                          | Uygulama Dozu                                                               | Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre |
| BAĞ*                                        | Bağ Mildiyösü<br>( <i>Plasmopara viticola</i> )                                | 500 g/100 L su                                                              | 14 gün                                 |
|                                             | Ölükol<br>( <i>Phomopsis viticola</i> )                                        | 500 g/100 L su<br>( Yaz uygulaması)<br>3500 g/100 L su<br>( kış uygulaması) | 14 gün                                 |
| ELMA                                        | Karaleke<br>( <i>Venturia inaequalis</i> )                                     | 1500 g/100 L su                                                             | 14 gün                                 |
| KAYISI                                      | Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen<br>( <i>Wilsonomyces carpophylus</i> ) | 625 g /100 L su<br>(Normal dönem)<br>1250 g/100 L su<br>(Dormant dönem)     | 14 gün                                 |
| ŞEFTALİ                                     | Yaprak Kıvrıcıklığı<br>( <i>Taphrina deformans</i> )                           | 1500 g/100 L su                                                             | 14 gün                                 |
| DOMATES                                     | Mildiyö ( <i>Phytophthora infestans</i> )                                      | 600 g/100 L su                                                              | 14 gün                                 |
| ZEYTİN                                      | Halkalı Leke<br>( <i>Spilocaea oleaginea</i> )                                 | 1.uygulama 1500 g/100 L su<br>2. uygulama 1000 g/100 L su                   | 14 gün                                 |

\*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz.

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılmalıdır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılır.

### KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

### İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



25 Ocak 2018  
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

## BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

### BAĞ MİLDİYÖ:

- 1.uygulama: Sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır.
- 2.ve sonraki uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortamları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

### BAĞ ÖLÜKOL:

- Kış uygulaması: Budamadan sonra gözler uyanmadan hemen önce yapılmalıdır.  
Yaz uygulaması:

- 1.Uygulama: sürgünler 2-3 cm olduğunda
- 2.Uygulama: sürgünler 8-10 cm olduğunda
- 3.Uygulama: sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

### ELMA KARALEKESİ:

- 1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sırcası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
- 2.Uygulama: Pembe rozet döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
- 3.Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
- 4.Ve diğer uygulamalar: İklim koşullarının hastalığının ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan bitki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

### SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE YAPRAK DELEN (KAYISI):

- 1.Uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
  - 2.Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde)
- Kayisılarda ilave olarak meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3. Uygulama yapılmalıdır.

### ŞEFTALİ YAPRAK KIVIRCIKLIGI:

Tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır.

### DOMATES MİLDİYÖ:

Çevrede domates yapraklarının 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle uygulamaya başlanır.

### ZEYTİN HALKALI LEKE:

Marmara Bölgesinde:

- 1.Uygulama: Sonbaharda sürgünler görülmeden hemen önce
- 2.Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce

Ege Bölgesinde:

- 1.Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce
- 2.Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Akdeniz Bölgesinde:

- 1.Uygulama: Hasattan sonra
- 2.Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden önce
- 3.Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, yapılmalıdır.

### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

**MAVİ BORDO 20 WG** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M:1 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **MAVİ BORDO 20 WG** 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M:1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

### KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Hiçbir bitki koruma ürünüyle karıştırılmadan (insektisit, fungisit, bitki gelişim düzenleyicileri vb.) tek başına kullanılmalıdır.



KORUMA Klor Alkali Sanayi ve Ticaret A.Ş.

## MAVİ BORDO® 20 WG

SUDA DAĞILABİLEN GRANÜL (WG)

|       |     |                         |
|-------|-----|-------------------------|
| GRUBU | M:1 | FUNGİSİT (Mantar İlacı) |
|-------|-----|-------------------------|

%20 Metalik Bakıra eşdeğer Bordo Bulamacı

### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanılmaz.
- Balıklara zehirlidir. Yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.
- Ürün, kendi ambalajları içinde rutubetsiz yerlerde muhafaza edilmelidir.
- Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

### FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

### RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

KORUMA Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş.  
Deniz Mah. Petrol Ofis Caddesi No: 43  
Derince-41900 / KOCAELİ  
Tel : (0262)239 22 70 (2 hat)  
Fax: (0262)229 33 24

®= KORUMA Klor Alkali San. ve Tic AŞ. 'nin tescilli markasıdır

Ünet SAZAK  
Ankara Bölge Müdürü  
KORUMA Klor Alkali  
Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Deniz Mah. Petrol Ofis Caddesi  
No:43 Derince-KOCAELİ  
Tepeli / V.İ. 561 000 7382  
Tic. Sic. No: Derince 419



25 Ocak 2018  
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR