

İmal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son kullanma tarihi : (" ")
Şarj No: (Damga ile) :
Ruhsat tarihi ve no'su : 19.03.2015-10167



KORUMA Klor Alkali Sanayi ve Ticaret A.Ş.

NAZATEM® TOP

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU	C3;11	G1;3	FUNGİSİT(Mantar İlacı)
			200 g/L Azoxystrobin+125 g/L Difenconazole

Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmayınız.
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün buhar ve / veya zerrecelerini solumayınız.
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
Deri ve göz ile temasından kaçınınız.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım talimatına uyunuz.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.
Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRENME BELİRTİLERİ:

Uygulama sırasında normal korunma tedbirlerine dikkat edilmelidir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Genel bilgi Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin.

Soluma Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Solunum yollarının açık kalmasını sağlayın. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Solunum zorluğu çekildiğinde, uygun eğitimli personel tarafından kazazedeye oksijen verilebilir. Tıbbi yardım alın. Bilinci yerinde olmayan kişiyi ilk yardım pozisyonunda yan tarafına yatırın ve solunumun gerçekleşebilmesini sağlayın.

Yutma Ağzı suyla iyice çalkalayın. Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınız. Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın.

Cilt teması Su ile yıkayın.

Göz teması Su ile yıkayın. Gözlerinizi ovmayın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. İlk yardım görevlilerinin

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Belirli bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) TEL: 114

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR			
BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
DOMATES (TARLA)	Septorya Yaprak Lekesi (<i>Septoria lycopersici</i>)	60 ml/da.	3 gün
	Erken yaprak yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	60 ml/da.	3 gün
	Yaprak Küfü (<i>Fulvia fulva (cke) ciferri-Cladosporium fulvum</i>)	60 ml/da.	3 gün
BAĞ*	Bağ Mildiyözü (<i>Plasmopara viticola</i>)	75 ml/100 L su	21 gün
	Bağ Küllemesi (<i>Erysiphe necator</i>)	75 ml/100 L su	21 gün
	Ölükol** (<i>Phomopsis viticola</i>)	75 ml/100 L su	21 gün
PATATES	Erken yaprak yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	60 ml/da.	14 gün
PATLICAN	Külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	90 ml/da.	3 gün
HIYAR	Kabakgillerde Külleme (<i>Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea</i>)	75 ml/da.	3 gün
KARPUZ	Kabakgillerde Külleme (<i>Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea</i>)	75 ml/da.	3 gün
KAVUN	Kabakgillerde Külleme (<i>Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea</i>)	75 ml/da.	3 gün
ANTEPFISTIĞI	Karazenk (<i>Pseudocercospora pistacina</i>)	100 ml/100 L.su	21 gün
ARMUT	Armutta Karaleke (<i>Venturia pirina</i>)	75 ml/100 L. su	14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılmaz.

** Bağda Ölükol hastalığı: Yaz ilaçlaması olarak uygulanmalıdır.

Net Miktarı (kg veya lt) :
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:Azoxystrobin, Difenconazole

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H332 Solunması halinde zararlıdır.

H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişmeyeceği yerde saklayın.

P261 Buharını/ spreyini solumaktan kaçınınız.

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanınız.

P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayınız.

Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartınız.

Durulamaya devam ediniz.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

Ünet SAZAK
Zir. Müh.

KORUMA Klor Alkali
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Deniz Mah. Petrol İşleri Cad.
No:43 Beşiktaş/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 264 000 7582
Tic. Sic. No: Derince 419

09 Ekim 2017

GIDA TARIMI ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılmalıdır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdaki karışım su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alanlara verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamızdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

DOMATES (TARLA) SEPTORYA YAPRAK LEKESİ:

İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulama yapılır.

DOMATES (TARLA) VE PATATESTTE ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI:

Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ürünün etki süresine bağlı olarak uygulama tekrarlanmalıdır.

DOMATES (TARLA) YAPRAK KÜFÜ:

Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir.

BAĞ MİLDİYÖ: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaştığında başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. Uygulamanın süresi ve hastalığın gelişme durumu meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

BAĞ KÜLEMESİ:

1. Uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde
2. Uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde
3. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının döktüğü ve korukların küçük saçma iriliğinde olduğu dönemde
4. Ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan ürünün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

BAĞ ÖLÜKOL: Yaz uygulaması:

1. Uygulama: sürgünler 2-3 cm olduğunda
2. Uygulama: sürgünler 8-10 cm olduğunda
3. Uygulama: sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.



KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

NAZATEM® TOP

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU	C3;11	G1;3	FUNGİSİT(Mantar İlacı)
200 g/L Azoxystrobin+125 g/L Difenconazole			

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara ve balıklara zehirlidir.
- Sulara bulaştırmaktan kaçınılmalıdır.
- Boş ürün ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Kalan ürün mahlulünü kuyu, havuz, çeşme yalıkları ve akarsulara dökmeyiniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiiksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

Ünet SAZAK
Zir. Müh.

KORUMA KLOR ALKALİ
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Deniz Mah. 1. Etap, 1. Kısım
No:43 D.01/100 CAELI
Tepecik Y.D. 514 000 7582
Tic. Sic. No: Darıca 419

09 Ekim 2017

GIDA TARIMI ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



PATLICAN KÜLLEME:

Uygulamalara çevrede ve serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulama yapılır. Hastalık şiddetine göre 10-14 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

HIYAR, KARPUZ VE KAVUN KABAKGİLLERDE KÜLLEME:

İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 C 'nin üstünde ve orantılı neminde %50'nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

ANTEPFISTIĞI KARAZENK:

1. Uygulama: İlk enfeksiyonların başlamasından önce yapılması gerekmektedir. Bu uygulama, çiçek dökümünden sonra, döllenmeyi takiben meyvelerin buğday danesi büyüklüğüne ulaştığı devrede yapılmalıdır.
2. Uygulama ve diğer uygulamalar: Hastalık için uygun enfeksiyon koşulları devam ettiği sürece 15 gün aralıklarla devam edilir.

ARMURT KARALEKESİ:

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. Uygulama: Pembe-Beyaz rozet tomurcuğu döneminde (çiçeklerayrı ayrı görüldüğünde)
3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
4. 4. Ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünlerin etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

NAZATEM ® TOP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C3;11/G1;3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için NAZATEM ® TOP 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C3;11/G1;3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

NAZATEM TOP bilinen birçok insektisit, fungusit, akarisit ve yaprak gübresiyle karışabilir. Bununla beraber endişe edilirse bir ön karışım denemesi önerilir. Karışım uygulamalarında uygulama tankındaki suya önce NAZATEM TOP konulmalı, karıştırmaya devam ederken diğer ürün ve gübre ilave edilmelidir. NAZATEM TOP'un domatesteki uygulamalarında yayıcı ve yapıştırıcılarla karıştırılarak kullanılması önerilmez.



KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

NAZATEM® TOP

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU	C3;11	G1;3	FUNGİSİT(Mantar ilacı)
			200 g/L Azoxystrobin+125 g/L Difenconazole

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA:

KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No: 43

Derince-41900 / KOCAELİ

Tel : (0 262) 239 22 70 (2 hat)

Fax: (0 262) 229 33 24

®= KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC AŞ. 'nin tescilli markasıdır

Ünet SAZAK
Zir. Müh.

KORUMA KLOR ALKALİ
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad.
No:43 D.43/1-KOCAELİ
Tepecik Y.D. 544 000 7582
Tic. Sic. No: Derince 419

09 Ekim 2017

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



Y. Bayrak
Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.