

Net Miktarı (kg veya l)
Azami perakende satış fiyatı:
İmal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son kullanma tarihi : (" " " ")
Şarj No: (Damga ile) :
Ruhsat tarih ve No'su:

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR			
BİTKİ ADI	ZARARLI ADI	KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE(GÜN)
Turunçgil	Kırmızı örümceği (<i>Panonychus citri</i>)	20 ml/100 l su (Yumurta, Nimf, Ergin)	14 gün
	Pas Böcüsü (<i>Phyllocoptruta oleivora</i>)		
Elma	Avrupa Kırmızı Örümceği (<i>Panonychus ulmi</i>)	30 ml/100 l su (Yumurta, Nimf, Ergin)	14 gün
	Akdiken Akarı (<i>Tetranychus viennensis</i>)	25 ml/100 l su (Yumurta, Nimf, Ergin)	14 gün
Kiraz	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml/100 l su (Nimf, Ergin)	14 gün
Bağ*	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml/100 l su (Nimf, Ergin)	14 gün
Şeftali	İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml/100 l su (Nimf, Ergin)	14 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLAMA ŞEKLİ:

Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kap içerisinde bir miktar su ile bulamaç haline getirilir. Sonra ilaçlama aletinin deposuna konulur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. İlaçlama sırasında karıştırmaya devam edilir. Hazırlanan bu karışım havanın serin ve sakin olduğu zamanda bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde püskürtülür.

KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC.A. Ş. SCOROLLAN® 240 SC

AKARİSİT(KIRMIZI ÖRÜMCEK İLACI)
SC (ŞÜSPANSİYON KONSANTRE)
ETKEN MADDE: 240 g/l Spirodiclofen içerir.
(3-(2,4-dichlorophenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl 2,2-dimethylbutyrate

GRUBU	23	AKARİSİT(KIRMIZI ÖRÜMCEK İLACI)
ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.EVDE KULLANMAYINIZ. ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ. BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ. MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ. BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ. DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ. BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA İLAÇLAMADAN SONRA 4 SAAT SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN GİREMEZ. İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ. TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR. KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.		

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: İnsanlarda belirgin bir zehirlenme belirtisi saptanmamıştır.
İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Yutulmuşsa derhal doktor çağrılmalı, hasta kusturulmalı veya midesi yıkanmalıdır. Deriye temas olursa bol su ve sabunla yıkanmalıdır. İlaçla bulaşık giysiler çıkarılmalıdır. Göze bulaşmışsa bol su ile yıkayınız. Göz doktoruna görününüz. Hastanın bilinci yerinde değilse yan pozisyona getiriniz ve bu şekilde taşıyınız.

ANTİDOTU ve GEREKLİ BİLGİLER:

Zehirlenme belirtileri görülürse semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Bilinen bir antidotu yoktur.

**UZEM (ULUSAL DANIŞMA ZEHİR MERKEZİ) TEL: 114
SADECE ZEHİRLENME DURUMUNDA ARAYINIZ.**

TEHLİKE ÖZELLİĞİ / İŞARETİ:



Xn: Zararlı

İÇİNDEKİLER	Spirodiclofen
-------------	---------------

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

R40:Kanserojenik etki için sınırlı delil.
R43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI
S2:Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S13: Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
S24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının.
S28:Cilt ile teması halinde bol su ve sabunla iyice yıkayın.
S29/56:Kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Atığını ve kabını güvenli bir biçimde bertaraf edin.
S36/37/39:Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
S46:Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S61:Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/Güvenlik Bilgi formuna başvurun.

KORUMA KLOR ALKALİ
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Deniz Mahallesi, KOCALCI
No:43, 364 000 7582
Tepecik M.D. 364 000 7582
Tic. Sic. No: Derince 419

10 Şubat 2016

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR



Handwritten signature

UYGULAMA ZAMANI :

Turunçgil Kırmızı Örümceği ve Pas Böcüsü: İlbaharda şubat sonu mart başı turunçgil bahçelerinde, büyüteç ile yaprakların alt ve üst yüzeyindeki hareketli bireyler sayılır. 10 yaprakta ortalama 4-9 birey varsa yazlık yağlar ile, eğer üstüdeyse akarisitlerden biriyle mücadele yapılmalıdır. İlaçlamaya zararlıların taze sürgünlere geçmeden önce yani çiçeklenmeden önceki devrede başlanmalıdır. Bu devre geçirilmiş ise meyve bağlandıktan bir hafta sonra da ilaçlama yapılabilir.

Elmada Kırmızı Örümcek ve Akdiken Akarı : Mayıs ayından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda kırmızı örümcek sayısının yaprak başına 8-10 adet bireyi geçmesi durumunda ilaçlama ilaçlama yapılmalıdır.

Kirazda Kırmızı Örümcek : İlaçlamalar meyvesiz ağaçlarda veya hasattan sonra yapılmalıdır.

Bağda Kırmızı Örümcek : Yaprak başına 15-20 aktif hareketli birey görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

Şeftalide Kırmızı Örümcek :

Yapılan sayımlarda, yaprak başına ortalama 3-5 adet in üzerinde kırmızı örümcek bulunması durumunda ilaçlama yapılabilir.

DAYANIKLILIK DURUMU : SCOROLLAN 240 SC bilinen akarisitler ile çapraz dayanıklılık göstermez. Dayanıklılık oluşma riskini azaltmak için önerilen dozlara uyulmalı ve bir sezonda 1 defadan fazla uygulama yapılmamalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

SCOROLLAN 240 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 23 olarak sınıflandırılmış bir akarisitir.. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **SCOROLLAN 240 SC** 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 23 harici) aynı ilaç yerine zararlılara karşı ruhsat almış diğer bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer ilaçların formülasyonu ve özellikle solvent miktarı karışımı etkiler. Bu nedenle karışım yapılacaksa uygulama öncesi bir karışım testi yapılmalıdır. Yayıcı yapıştıracı karıştırılmasına gerek yoktur.

KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC.A.Ş.
SCOROLLAN®240 SC

AKARİSİT(KIRMIZI ÖRÜMCEK İLACI)
SC (SÜSPANSİYON KONSANTRE)

ETKİN MADDE : Litrede 240 gram Spirodiclofen içerir.
(3-(2,4-dichlorophenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl 2,2-dimethylbutyrate

GRUBU	23	AKARİSİT(KIRMIZI ÖRÜMCEK İLACI)
-------	----	---------------------------------

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

- Arılara zehirlidir. Ürünü çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
- İlacı kapalı olarak serin ve kuru yerde muhafaza edin
- Boş ilaç ambalajlarını başka maksatla kullanmayın. Usulüne uygun imha edin.

KULLANMADAN ÖNCE ŞİŞEYİ İYİCE ÇALKALAYINIZ**DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

FİRMA ADI VE ADRESİ :

RUHSAT SAHİBİ, İMALATÇI VE PAZARLAYICI FİRMA :

KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DENİZ MAH.PETROL OFİSİ CAD. NO : 43 -

DERİNCE/KOCAELİ

TEL: + 90 (262) 239 22 70,

Fax: + 90 (0262)229 33 24

®= KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC AŞ. 'nin tescilli markasıdır.

KORUMA KLOR ALKALİ
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No. 43
Derince-KOCAELİ
Tepecik V.D. 564 000 7552

10 Şubat 2016

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

