

Net Miktarı (kg veya lt) :  
Azami perakende satış fiyatı: Baskı  
İmal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)  
Son kullanma tarihi : ( " " )  
Şarj No: (Damga ile) : 20.02.2014 &9507

#### KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ADI	KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE(PHI)
GÜL (SERA)	Gül yaprakbiti ( <i>Macrosiphum rosae</i> )	500 ml / 100 l su (Ergin, Nimf)	7 gün
TÜTÜN	Şeftali yaprakbiti ( <i>Myzus persicae</i> )	300 ml / da (Ergin, nimf)	28 gün
PAMUK	Kırmızı Örümcekleri ( <i>Tetranychus urticae</i> ve <i>Tetranychus cinnabarinus</i> )	200 ml / da. (Ergin larva, nimf)	--
BİBER (SERA)	Şeftali yaprakbiti ( <i>Myzus persicae</i> )	500 ml / 100 l su (Ergin , larva, nimf)	3 gün
DOMATES (SERA)	Domates Güvesi ( <i>Tuta absoluta</i> )	500 ml / 100 l su (Larva)	3 gün
ZEYTİN	Zeytin Sineği ( <i>Bactrocera oleae</i> )	500 ml / 100 l su (Ergin , larva, nimf)	3 gün
PATATES	Patates böceği ( <i>Leptinotarsa decemlineata</i> )	250 ml / da. (Larva)	3 gün
HIYAR (SERA)	Kırmızı Örümcek ( <i>Tetranychus urticae</i> , <i>T. cinabarinus</i> )	500 ml / 100 l su (Ergin , larva, nimf)	3 gün
ÇİLEK (TARLA-SERA)	Kırmızı Örümcek ( <i>Tetranychus urticae koch</i> , <i>T. cinabarinus</i> )	300 ml / 100 l su (Ergin , larva, nimf)	3 gün
ELMA	Elma Yeşil Yaprakbiti ( <i>Aphis pomi</i> )	300 ml / 100 l su (Ergin , nimf)	3 gün
KIRAZ	Kiraz sineği ( <i>Rhagoletis cerasi</i> )	500 ml / 100 l su (Ergin)	3 gün

#### İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLAMA ŞEKLİ :

Önce ilaçlama aletinin deposunu yarıya kadar suyla doldurunuz. Gerekli miktarda ilacı ayrı bir kaptan bir miktar suyla iyice karıştırılarak aletin deposuna boşaltılır. İlaçlama aletinin karıştırma düzeni devamlı çalıştırılarak, depo seviyesine kadar kalan su miktarı ilave edilir. İlaçlı mahlul bekletilmeden kullanılmalıdır. İlaçlamaya başlamadan evvel memelerin düzgün çalıştığından emin olunuz. Uygulama sabahleyin veya akşam üzeri havanın çok sıcak olmadığı zamanlarda yapılmalıdır.

#### SUHULET®10 EC organik tarımda kullanılabilir.

Biberde Şeftali yaprak biti : 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye başlamak gerekir. Bununla birlikte parazitoid ve predatörler gözlenerek ilaçlamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.



QR

KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

# SUHULET® 10 EC

ORGANİK İNEKTİSİT-AKARİSİT  
( Böcek ve kırmızı örümcek ilacı)

Emülsiyon Konsantr (EC)

Etkili madde :Litred 10 gram Azadirachtin içerir.

{ Dimethyl (3S,3aR,4S,5S,5aR,5a'R,7aS,8R,10S,10aS)-8-acetoxy-3,3a,4,5,5a,5a',7a,8,9,10-decahydro-3,5-dihydroxy-4-((1S,3S,7S,8R,9S,11R)-7-hydroxy-9-methyl-2,4,10-trioxatetracyclo[6.3.1.0<sup>3,7</sup>.0<sup>9,11</sup>]dodec-5-en-11-yl)-4-methyl-10[(E)-2-methylbut-2-enoyloxy]-1H,7H-naphtho[1,8a:8-bc:4,4a-c']difuran-3,7a-dicarboxylate}

GRUBU UN İNEKTİSİT

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.EVDE KULLANMAYINIZ. ÇOCUK- LARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ. BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE / VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ. BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ,SİGARA KULLANMAYINIZ.DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ. BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA İLAÇLAMA BİTENE KADAR İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ.BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı,mide bulantısı,halsizlik.

#### İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

İlaçla bulaşık elbiseleri çıkartın.Deriyle teması halinde bol su ve sabunla yıkayın.Gözlere bulaşması halinde en az 15 dakika boyunca bol suyla yıkayın ve tıbbi yardım sağlayın.Yutulması halinde hasta kusturulmalıdır.Aşırı solunması durumunda hastayı temiz havaya çıkarın.

#### TEDAVİSİ VE ANTİDOTU:

Özel bir antidotu yoktur, belirtilere göre tedavi uygulanır.

UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) TEL : 114  
SADECE ZEHİRLENME DURUMUNDA ARAYINIZ.

28 Nisan 2015

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

İÇİNDEKİLER Azadirachtin, N butanol ,Butyl asetat

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

R10: Alevlenir.

R22: Yutulması halinde zararlıdır.

R41: Gözde ciddi hasar riski.

R66: Tekrarlanan maruziyette deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

R67: Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

S1/2 : Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S20/21:Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.

S25: Göz ile temasından sakının.

S36/39:Uygun koruyucu giysi, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S45: Kaza durumunda yada kendinizi iyi hissetmezseniz, acil olarak tıbbi yardım alın.

KORUMA KLOR ALKALİ  
Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Denizli Merkezli Cad.  
No: 43700000000 KOCALI  
Tepeköy 2. 434 000 7582  
Tic. Sic. No: Denizli 419



**Domates:** Domates Güvesine karşı ilaçlama bitkilerde % 10 bulaşıklık görüldüğü zaman tek uygulama olarak yapılır.

**Zeytin Sineği:** Meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde vuruk sayımları yapılarak yeterli vuruk saptandığında ilaçlamaya geçilir. Bu oran kaplama ilaçlamalarda salamuralıklarda %1, yağlıklarda %6-8 vuruktur.

**Patates Böceği :** Birinci döle karşı ilaçlama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle karşı ilaçlama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir.

**Hıyarda Kırmızı Örümcek:** yaprak başına 3 adet, büyük yapraklı sebzelerde 5 adet canlı Kırmızı örümcek bulunduğuunda ilaçlama yapılır.

**Çilekte Kırmızı Örümcek:**

- **Erken dönem uygulaması:** Kırmızı örümceklerin her yıl sorun olduğu çilek alanlarında, çiçek ve yeşil meyve döneminde (ilk olgun meyveler görülmeden önce) kırmızı örümcek görüldüğünde bir ilaçlama yapılır. Erken dönem uygulaması, kullanılan ilaçların meyvelerde kalıntı bırakmaması açısından daha güvenlidir.
- **Mevsim içi uygulaması:** Erken dönem uygulamasının yapılmadığı durumlarda, mevsim içerisinde ilaçlama yapılabilir. Bunun için, açıkta yetiştirilen çilek alanlarında, yapraklar mevsim başında, mart sonu-nisan başında başlayarak 3-5 gün aralıklarla düzenli olarak kontrol edilir. Bitkilerin özellikle alt ve orta bölümlerinden olmak üzere tesadüfen alınan en az 50 yaprakçık incelenir. Yaprakçık başına, hareketli dönemde ortalama 15 ve üzerinde kırmızı örümcek tespit edilmesi halinde ilaçlamaya karar verilir. Meyve toplanmasından hemen sonra ilaçlama yapılır.

**Elmada Yeşil Yaprakbiti :** Elma Yeşil Yaprakbitine karşı en uygun ilaçlama zamanı , ağaçların yapraklı olduğu devrede 100 sürgünde 15 bulaşık görüldüğü zamandır.

**Kirazda Kiraz sineği :** Bölgelere göre değişmekle birlikte nisan-mayıs aylarında "görsele sarı yapışkan tuzak + amonyak kapsülü" 2 adet/dekar olacak şekilde kiraz bahçelerine ağaçların güneydoğu yönüne asılır. İlaçlama tuzaklarda ilk ergin görüldükten sonra en geç bir hafta içinde yapılır. Genellikle bir ilaçlama yeterli olmaktadır. Ancak, birinci ilaçlamadan sonra, tuzaklardaki sinek yakalanmaları devam ediyorsa, ilacın etki süresi ve hasat tarihi dikkate alınarak ikinci ilaçlama yapılabilir.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

**SUHULET®10 EC** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup **UN** olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygu-lamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **SUHULET®10 EC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup UN**) aynı ilaç yerine zararlıya karşı ruhsat almış diğer bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARİŞİBİLİRLİK DURUMU**

Bordo Bulamacı hariç ,diğer insektisit, akarisit ve fungusit ve yaprak gübreleriyle karıştırılarak kullanılabilir.

**KORUMA Klor Alkali Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

# SUHULET® 10 EC

**ORGANİK İNSEKTİSİT-AKARİSİT  
( Böcek ve kırmızı örümcek İlacı)**

**Emülsiyon Konsantr (EC)**

**Etkili madde :** Litrede 10 gram Azadirachtin içerir.

{ Dimethyl (3S,3aR,4S,5S,5aR,5a<sup>1</sup>R,7aS,8R,10S,10aS)-8-acetoxy-3,3a,4,5,5a,5a<sup>1</sup>,7a,8,9,10-decahydro-3,5-dihydroxy-4-((1S,3S,7S,8R,9S,11R)-7-hydroxy-9-methyl-2,4,10-trioxatetracyclo[6.3.1.0<sup>3,7</sup>.0<sup>9,11</sup>]-dodec-5-en-11-yl)-4-methyl-10[(E)-2-methylbut-2-enoyloxy]-1H,7H-naphtho[1,8a,8-bc:4,4a-c']difuran-3,7a-dicarboxylate)

GRUBU	UN	İNSEKTİSİT
-------	----	------------

**ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.EVDE KULLANMAYINIZ.ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE / VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ,SİGARA KULLANMAYINIZ.DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA İLAÇLAMA BİTENE KADAR İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.**

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

**KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ.BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.**

**DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:**

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- Göz koruyucusu kullanınız.Sentetik eldiven giyiniz.
- İlaçlama sırasında mümkün olduğunca ilaç ile temastan kaçınınız.
- İlacı kendi ambalajında,ağzı kapalı olarak saklayınız.
- Havuzları,nehirleri ve su yollarını ilaçla ve boş ambalajla kirlenmeyiniz.
- Boş ilaç ambalajlarını atık tasfiyesinin tehlike oluşturmayacağı bir yerde, yakma yoluyla veya başka bir uygun yöntemle imha ediniz.
- Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında fitotoksik değildir.

**ÜRETİCİ FİRMA :**

**AGRI LIFE**

Plot 154 /A5 , SVCIE,IDA Bollaram 502325,

Medak District, Andhra Pradesh, HİNDİSTAN

**RUHSAT SAHİBİ VE PAZARLAYICI FİRMA :**

**KORUMA Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş.**

Deniz Mah.Petrol Ofisi Cad.No: 43

41900- Derince/

Tel :00 90 (262)239 22 70 (2 hat)

Fax :00 90 (262)229 33 24

®= KORUMA Klor Alkali San. ve Tic AŞ. 'nin tescilli markasıdır.

**KORUMA Klor Alkali**  
Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad.  
No:43 Derince-KOCAELİ  
Tepelik Y.D.364 000 7582  
Tic. Sic. No:1 Derince 419

**28 Nisan 2015**

**GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR**