



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĐI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

GIDANI KÖRU
SOFRANASAHİPCİK

Sayı : E-81466379-320.04.02-1152469

09.04.2021

Konu : ALLEGRO-RAF ÖMRÜ

KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE
DENİZ MAH. PETROL OFİSİ CAD. KORUMA KLOR ALKALİ FABRİKASI FABRİKA 43
DERİNCE / KOCAELİ

Firmanız adına ruhsatlı bulunan ALLEGRO isimli bitki koruma ürününüz için raf ömrünün uzatılması hakkındaki başvurunuz incelenmiş olup, mer'i mevzuat kapsamında düzenlenen raf ömrü 3 yıl olarak onaylı etiketiniz yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Bakan a.
Daire Başkanı V.

Ek:

1 - Etiket (3 sayfa)

2 -

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: B9E2EAA0-9DB4-49AF-92BA-1B8A78208DD7

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara

Tel: (0312) 287 33 60 Faks:

Bilgi için: Dr. Hatice EREN
Mühendis



İmal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son kullanma tarihi : (" " " ")
Şarj No: (Damga ile):
Ruhsat tarih ve no : 18.08.1998 & 3468 /98-148



KORUMA Klor Alkali San.Tic.A.Ş.

ALLEGRO

İSLANABİLİR TOZ (WP)

GRUBU	U:33	FUNGİSİT(MANTAR İLACI)
% 80 Fosetyl-AI		

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile hasat arasındaki süre
TURUNÇGİLLER (Limon, Portakal, Greyfurt, Mandarin)	Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması (<i>Phytophthora citrophthora</i>)	200 g/100 L su	14 gün
	Turunçgilde hasat sonrası kahverengi meyve çürüklüğü (<i>Phytophthora citrophthora</i>)	300 g/100 L su meyveler ilaçlı suya 3 dakika süre ile daldırılır.	
ARMUT	Yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında ateş yanıklığı (<i>Erwinia amylovora</i>)	400 g/100 L su	14 gün
HER UYGULAMADAN ÖNCE AĞAÇLARDAKİ ENFEKTELİ KISIMLAR DEZENFEKTAN BATIRILMIŞ BİR ALET İLE UZAKLAŞTIRILMALIDIR.			
HIYAR, KAVUN	Kabakgillerde mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	200 g/100 L su	3 gün
SOĞAN	Soğan Mildiyö (<i>Peronospora destructor</i>)	150 g/100 L su	14 gün
DOMATES	Domates Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	250 g/100 L su	7 gün
NAR	Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü (<i>Phytophthora spp.</i>)	200 g/100 L su	14 gün

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya bitki koruma ürünü kuruyuncaya kadar insan ve hayvan sokmayınız.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Aşırı dozda alındığında uyku hali, titreme, nefes darlığı, adale kasılması. Diğer zararlılık belirtileri "Zararlılık ifadeleri (H)" bölümünde verilmiştir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Genel bilgi Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin.
Soluma Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.
Yutma Ağız suyla iyice çalkalayın. Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alın. Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın.
Cilt teması Ciltte kalan parçaları temizleyin. Su ile yıkayın.
Göz teması Hemen bol su ile yıkayın. Gözlerinizi ovmayın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin ve tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) TEL: 114



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

24 Mart 2021

Net :
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER Fosetyl-AI



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P280 Göz ve yüz koruyucu kullanın.
P280 Koruyucu kıyafet kullanın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.
Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimini arayın.
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- ALLEGRO hızlı nem çekici olduğundan topaklaşmaması için hava almayacak şekilde korunmalıdır.

Gökhan BAŞTUĞ
Teknik Müdür
Ziraat Yüksek Mühendisi

KORUMA Klor Alkali
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No. 43
Derince-KOCAELİ
Tepecik V.D. 564 000 7582

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılmalıdır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yanında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

ALLEGRO bitki özsuunda yapraktan köke, kökten yaprağa taşınabilen iki yönlü sistemik bir fungusittir. O nedenle, uygulandığında 5-6 saat sonra şiddetli yağış bile olsa uygulamanın tekrarı gerekmez. Ancak bitki koruma ürününün kısa sürede ve homojen olarak bitki özsuunu geçebilmesi için iyi bir ıslatma sağlanmalıdır.

Hiyar, kavunda yalancı mildiyö: Uygulamaya bitkiler kol atmaya başladığında ya da çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile başlanır, 10 gün ara ile tekrarlanır.

Turuncgill meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanma hastalığı:

*Meyve enfeksiyonlarına karşı:

1. Uygulama: Sonbaharda yağışlar başlamadan veya ilk yağmurlardan hemen sonra yapılmalıdır.
2. Uygulama: Havalarda yağışlı giderse 1. Uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

*Gövde enfeksiyonlarına karşı:

Enfekteli ağaçlardaki yaralar ekim, ocak ve mart aylarında odun dokusuna kadar temizlenmelidir. Gövde ve kök boğazı enfeksiyonlarında bir uygulama yapılır. Yara yerindeki kabuk temiz bir bıçak ile tamamen temizlenmeli ve özellikle ağaç tacının 1-1,5 m yüksekliğe kadar olan kısımları iyice ürünle kaplanmalıdır.

Turuncgilde hasat sonrası kahverengi çürüklüğü: Meyveler karışıma 3 dakika süre ile daldırılır.

Armut ateş yanıklığı: Çiçek başlangıcına tam çiçekte 1'er uygulama, hastalık için uygun koşullar devam ederse, bir 3. Uygulama gerekebilir.

Soğan mildiyö: Çevrede ilk hastalık belirtileri görülünce uygulamaya başlanır. 10 gün ara ile uygulama yapılır.

KORUMA

KORUMA KLOR ALKALİ SAN.TİC.A.Ş.

ALLEGRO

İSLANABİLİR TOZ (WP)

GRUBU	U:33	FUNGİSİT(MANTAR İLACI)
-------	------	------------------------

% 80 Fosetyl-AI

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 3 yıl süre ile üretilen ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
24 Mart 2021
KABUL EDİLMİŞTİR.

Dr. Neşrin AKKUR ARICAN
Daire Başkanı V.

Gökhan BAŞTUĞ
Teknik Müdür
Ziraat Yüksek Mühendisi

KORUMA KLOR ALKALİ
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No. 43
Derince-KOCAELİ
Tepecik V.D. 564 000 7582

Domates Mildiyösü: Uygulamaya çevredeki domates yapraklarının 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz küllü örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Nar Kök ve Kök Boğazı hastalığına karşı, 1. uygulama ilkbahar sürgünlerinin gelişimi döneminde, 2. uygulama yaz sürgünlerinin döneminde ve 3. uygulama sonbahar sürgünlerinin gelişimi döneminde yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

ALLEGRO adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup U:33** olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **ALLEGRO** 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise (**Grup U:33 harici**) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

ALLEGRO, yaprak gübrelere, bakırlı bitki koruma ürünleri ile karışmaz. Yağ veya yağlı bitki koruma ürünleri, **ALLEGRO**'nun yapraklara nüfusunu önlediğinden daha sonra kullanılmalıdır. Bitki koruma ürünlerinde değişik kalitede dolgu maddeleri kullanıldığından, karışım yaparken yaygın uygulamadan önce küçük çapta ön denemeler yapılması önerilir.



KORUMA Klor Alkali San. Tic. A.Ş.

ALLEGRO

ISLANABİLİR TOZ (WP)

GRUBU	U:33	FUNGİSİT(MANTAR İLACI)
-------	------	------------------------

% 80 Fosetyl-AI

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA:
KORUMA Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş.
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No : 43
Derince-41900 -KOCAELİ
Tel : (0262)239 22 70 (2 hat)
Fax:(0262)229 33 24

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

24 Mart 2021
24 Mart 2021



Dr. Meriç ÇAKIR ARICAN
Başkan

Gökhan BAŞTUĞ
Teknik Müdür
Ziraat Yüksek Mühendisi

KORUMA Klor Alkali Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No. 43
Derince-KOCAELİ
Tepecik V.D. 564 000 7582