

İmal Tarihi :
Son Kullanma tarihi :
Sarı No: (Danga ile) :
Ruhsat tarihi ve no/su : 05.02.2015 / 10078

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR			SON
BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	HASAT ARASINDAKİ SÜRE(GÜN)
Sogan	Sümme (<i>Urocystis cepulae</i>)	5 kg/100 kg arpacak tohum	---
Nohut	Anttraknoz (<i>Ascochyta rabie</i>)	300 g/100 kg tohum	---
Kavun, Karpuz	Kabakgillerde anttraknoz (<i>Colletotrichum sp.</i>)	300 g/100 kg tohum	---
Şeker Pancarı	Çökerten (kök yanıklığı) (<i>Phoma betae</i>)	400 g/100 kg tohum	---
Sebzeye fideleri	Sebzeye fidelerinde Çökerten (<i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Phythium spp.</i> , <i>Fusarium spp.</i> , <i>Sclerotinia spp.</i> , <i>Alternaria spp.</i> ,	200 g/100 kg tohum (Fidelikte Tohum ilaçlaması)	---

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılmalıdır. İlaçlama makinesinin deposu yanrya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakden karışım su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işleminde devam edilir. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılır.

KALIBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

ILAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

06 Temmuz 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAYIT EDİLMİŞTİR

Dr. Nesrin MİRARICAN
Genel Müdür

KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC.A.Ş. KORTIRAM FORTE® 80 WG SUDA DAĞILILABİLİR GRANÜL (WG)



GRUBU M3 FUNGİSİT (MANTAR İLACI) % 80 Tıhram

Önce etiketi okuyunuz.

Evide kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım talimatına uyunuz.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİMLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Göz, burun, boğaz ve deride tahriş, baş dönmesi, baş ağrısı, halsizlik, mide bulantısı, bağırsak bozukluğu, ishal, bayılma.

ILK YARDIM ÖNLEMLERİ: Solunma Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Solunum yollarının açık kalmasını sağlayın. Yaka, kavat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Solunum zorluğu geldiğinde, uygun eğitilmiş personel tarafından kazazedeye oksijen verilebilir. Tıbbi yardım alın. Bilinci yerinde olmayan kişiyi ilk yardım pozisyonunda yan tarafına yatırın ve solunumun gerçekleşebilmesini sağlayın.

Yutma Ağzı suyla iyice çalkalayın. Birkaç bardak su veya süt için. Kusma tehlikeli olabileceğinden dolay, kazazede kendini rahatsız hissederse kusmayı durdurun. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Bilinci yerinde olmayan kişiyi ilk yardım pozisyonunda yan tarafına yatırın ve solunumun gerçekleşebilmesini sağlayın. Kazazedeği gözleml altında tutun. Tıbbi yardım alın.

Cilt teması Madedenin hemen cildin üzerinden alınması önemlidir. Gelişmekte olan herhangi bir hassasiyet belirtisi durumunda, daha fazla maruziyetden kaçınılmalıdır. Kirliği sabun ve suyla veya bilinen cilt temizleyici bir madde ile temizleyin. Yıkamanın ardından belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.

Göz teması Hemen bol su ile yıkayın. Gözlerinizi ovmayın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin ve tıbbi yardım alın.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)TEL.: 114

Net Miktarı (kg veya lt)
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER Tıhram

ZARARLILIK İŞARETLETLERİ:



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H302+H332 Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır.

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P271 Sadece dışarda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/ müdahale alın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/ müdahale alın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Uygulamaya koruyucu olarak başlanmalı ve bitkiler kaplama olarak ilaçlanmalıdır.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz

ÜRETİCİ SAZAK
Antarcra Fölge Müdürlüğü

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIMA ŞEKLİ:

SOĞAN SÜRMESİ:

Tohum ürünleri tohumlar hafifçe nemlendirildikten sonra kapalı bir kapta iyice karıştırılır ve ekilir.

NOHUT ANTRAKNOZU:

Tohum uygulaması: Tohum ekiminin yapılacağı gün uygulanmalıdır.

KABAKGİLLERDE ANTRAKNOZ (KAVUN-KARPUZ):

Tohum uygulaması: Ekimden önce tohumlar 1 saat süreyle ıslatılıp, 1 saat kurutulduktan sonra uygulanmalıdır.

ŞEKERPANCARINDA ÇÖKERTEN (KÖK YANIKLIĞI)

Ekimden önce tohum uygulaması yapılmalıdır.

SEBZE FİDELERİNDE ÇÖKERTEN:

Tohum ilaçlaması: Ekimden önce tohumla uygulanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

KORTIRAM FORTE® 80 WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M3 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **KORTIRAM FORTE® 80 WG** 'nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplan uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M3 hariç) diğer bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz

KARŞIYABİLİRLİK DURUMU:

Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.



KORUMA Klor Alkali San. ve Tic.A.Ş.

KORTIRAM FORTE® 80 WG

SUDA DAĞILABİLİR GRANÜL (WG)

GRUBU M3 FUNGİSİT (MANTAR İLACI)

% 80 Thiam(TMTD)

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA:

KORUMA Klor Alkali San ve Tic. A.Ş.

Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No: 43

Derince-41900 /KOCAELİ

Tel : (0262)239 22 70 (2 hat)

Fax : (0262)229 33 24.

ÜRET SAZAK

Ankara Bölge Müdürü

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
MÜHÜR
MÜDÜR
M. YILMAZ
T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE KLİMA BAKANLIĞI
MÜHÜR
MÜDÜR
M. YILMAZ
T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE KLİMA BAKANLIĞI

06 Temmuz 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

Dr. Nesrin ÇAKIR KARİFİCAN

Daire Başkanı

