


EC FERTILIZER

ÇINKOLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ (ÇINKO SÜLFAT-EDTA İÇERKLİ)

KORUMA ZINC

GARANTİ EDİLEN İÇERİK : W/W

Suda Çözünür Çinko (Zn) : %3
 Çinko (Zn) EDTA ile şelatlı : %2



Çinko(Zn) şelatının stabil olduğu PH aralığı: 3,5-9

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN cc/dekar (100 litre su ile)	DAMLA SULAMADAN cc/dekar (1 ton su ile)
Domates-Biber Patlıcan-Hıyar	Fide dikiminden itibaren	200 - 250	400 - 700
Karpuz-Kavun-Kabak	Fide dikiminden itibaren	200 - 250	400 - 700
Çilek	Fide dikiminden itibaren	200 - 250	400 - 700
Bağ-Kivi	Çiçeklenme öncesi gözler uyanırken	200 - 250	400 - 700
Muz	Doğum öncesinde	200 - 250	400 - 700
Narenciye	Çiçeklenme öncesinde	200 - 250	400 - 700
Kiraz-Vişne-Şeftali-Kayısı-Erik	Çiçeklenme öncesinde	200 - 250	400 - 700
Elma-Armut-Ayva	Çiçeklenme öncesinde	200 - 250	400 - 700
Zeytin	Çiçeklenme öncesinde	200 - 250	400 - 600
Mısır-Ayçiçeği	Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren	200 - 250	400 - 700
Patates-Ş. Pancarı Havuç	Çiçeklenme öncesinde	200 - 250	400 - 700
Buğday-Arpa-Çeltik	Kardeşlenme döneninde	200 - 250	-
Pamuk	Taraklanmadan önce	200 - 250	400 - 500
Fasulye-Nohut Mercimek	Gelişme dönemi boyunca	200 - 250	400 - 700
Fındık-Ceviz-Antep Fıstığı	Sürgün zamanı	200 - 250	400 - 700
Yapraklı yenen sebzeler (Marul, Kırıçık, Lahana vb.)	Gelişme dönemi boyunca	200 - 250	400 - 500
Soğan-Sarıımsak	Gelişme dönemi boyunca	200 - 250	400 - 600

Yapraktan uygulama dozları 10-15 gün ara ile, damla sulama dozları ise haftalık olarak uygulanır.

KORUMA ZINC

Bitkilerde çinko eksikliğini gidermek ya da çinko eksikliği oluşumunu erken dönemde engellemek için kullanılması tavsiye edilir.

HAZIRLANISI VE UYGULAMA SEKLİ

Uygulama aletine bir miktar su konur. Önerilen dozda Çinko ilave edildikten sonra depo yeterli miktarda suya tamamlanır, karıştırılır ve uygulanır. Yapraktan, topraktan ve damla sulamadan: her türlü uygulama aleti ve metodu ile verilebilir.

Önet SAZAK
 Ankara Bölge Müdürü
KORUMA KLOR ALKALİ
 Sancılı ve Karaoğlu Mah.
 Deniz Mah. Astero Yıldız Cad.
 No:43 Dörünç KÜCAKLI
 Tereslik A.D. 54 000 7582
 Tel. Sek. No: Dörünç 419

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Kuvvetli alkali (bordo bulamacı) ve asidik ilaçlarla karışmaz.



FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisini dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksisite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

ÇÖZÜNLÜĞÜ

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür. hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayın. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı + 2 ila + 20°C derece arasında olmalıdır.

UYARILAR:

- *Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- *Asla uygun doz oranlarını aşmayın ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- *Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz teması halinde bol su ile yıkayınız.
- *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.

LİSANS NO : 0791

TESCİL NO :

PARTİ/SERİ NO :

ÜRETİM TARİHİ :

SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır

NET AĞIRLIK veya HACİM : 1-2-3-4-5-10-15-20-25 lt
1.1-2.2-3.3-4.4-5.5-11-16.5-22-27.5 kg

ÜRETİCİ FİRMA

KORUMA KLOR ALKALİ SAN.ve TİC. A.Ş.

Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No:43 Derince 41900 KOCAELİ /TURKEY

Tel : + 90 (262) 239 22 70 Fax: + 90 (262) 229 33 24

TAHHÜT

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder. aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

Ünet SAZAK
Ankara Bölge Müdürü