

İmal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son kullanma tarihi : (" ")
Şarj No: (Damga ile) :
Ryhsat tarihi ve nosu:

TAVSİYE EDİLDİĞİ BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLILAR:

AMANGEL SL hidrolize protein içeren bir böcek cezbedici tuzağı olup, mücadelesi yapılacak zararlıya karşı tavsiye edilen insektisit ile karıştırılarak kısmi dal uygulaması şeklinde tatbik edilir.

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU / 10 LT SUYA
KIRAZ	Kiraz Sineği (<i>Rhagoletis cerasi</i>)	500 ml AMANGEL SL + 400 gram Koruma Malathion WP / 10 litre su (Zehirli yem kısmi dal ilaçlaması)(Ergin)
ZEYTİN	Zeytin Sineği (<i>Bactocera oleae</i>)	500 ml AMANGEL SL + 400 gram Koruma Malathion WP / 10 litre su (Zehirli yem kısmi dal ilaçlaması)
TURUNÇGİLLER	Akdeniz Meyve Sineği (<i>Ceratitıs capitata</i>)	500 ml AMANGEL SL + 400 gram Koruma Malathion WP / 10 litre su (Zehirli yem kısmi dal ilaçlaması)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA HAZIRLANMASI:

Önce tavsiye edilen insektisit (Koruma Malathion WP-% 25 Malathion)dozu ayrı bir kaptan su ile karıştırılarak bulamaç haline getirilir, sonra tavsiye edilen AMANGEL SL hazırlanan bu bulamaca katılarak karıştırmaya devam edilir İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakken karışım su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



KORUMA Klor Alkali San. ve Tic.A.Ş.

AMANGEL® SL

SUDA ÇÖZÜNEN KONSANTRE (SL)

GRUBU	--	BÖCEK TUZAĞI (PROTEİN BÖCEK CEZBEDİCİ)
		421 g/L Hidrolize Protein

Önce etiketi okuyunuz

Evde kullanmayınız

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün süre ile insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım talimatına uyunuz.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Solunduğunda ve yutulduğunda deri ve göz temasında zararlıdır. Herhangi bir zehirlenme durumunda aşağıdaki ilkyardım tedbirlerini alınız ve doktor çağırınız.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Solunma Önerilen özel depolama tedbirleri yoktur. Boğazda tahriş oluşmuşsa veya öksürük devam ediyorsa, şu adımları uygulayın: Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

Yutma Önerilen özel depolama tedbirleri yoktur. Boğazda tahriş oluşmuşsa veya öksürük devam ediyorsa, şu adımları uygulayın: Ağzınızı çalkalayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

Cilt teması Önerilen özel depolama tedbirleri yoktur. Su ile yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

Göz teması Su ile yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Bilinen spesifik bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) TEL: 114

Net Miktarı (kg veya lt) :
Azami perakende satış fiyatı:

Zararlılık İfadeleri

NC Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır.

ÖNLEM İFADELERİ

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Tavsiyelere uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.
- Evcil hayvanların ve çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzak tutunuz.
- Kullanımdan sonra sabun ve su ile baştan sona yıkayınız.
- Uçak ile püskürtmeyiniz.
- Sağlık ve çevre için risklerinden kaçınmak için talimatları takip ediniz.
- Ürün ve kapları ile diğer mahsul, yiyecek, hayvan yemleri ve suyunu kirletmeyiniz.
- İlaç kendi ambalajında ağız kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boş kapları yeniden kullanmayınız. Rüzgara karşı uygulamayınız. Boş ilaç ambalajlarını atık tasfiyesinin tehlike oluşturmayacağı bir yerde , yakma yoluyla veya başka bir uygun yöntemle imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiiksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

Gökhan BAŞTUĞ
Teknik Müdür
Ziraat Yüksek Mühendisi

KORUMA Klor Alkali
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No. 43
Deriñçe-KOCAELİ
Tepecik V.D. 564 000 7582

21 Şubat 2022
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



N. Aray

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Kiraz: Görsel sarı yapışkan tuzaklarda ilk ergin yakalandığı zaman Kiraz ağaçlarının güneydoğusundaki meyveli kalınca bir dalın 1,5-2 m²'lik kısımlarına sıra atlamadan meyve ve yaprakların homojen şekilde ıslanması sağlanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. İlaçlamalar açık ve rüzgârsız hava koşullarında yapılmalıdır. İlaçlamalar ilacın etki süresine ergin uçuşunun devam etmesi durumuna göre ve son ilaçlama ile hasat arasındaki süre dikkate alınarak tekrar edilir.

Zeytin: İlaçlama sofralık zeytinlerde % 1 vuruş, yağlık çeşitlerde % 6-8 vuruş görüldüğünde ağaçların güneydoğu kısımlarına 1,5-2 m² 'lik kısmına sıra atlamadan iyice ıslatılarak yapılmalıdır. Dış bulaşmaların olmadığı zeytinliklerde 10 gün ara ile hasata 20 gün kalana kadar devam edilir.

Turunçgil: Meyvelerin dipten sararmaya başladığı dönemde (hasat dönemi) ağaçların güney tarafında kalınca bir dalın 1,5-2 m²'lik kısımlarına sıra atlamadan meyve ve yaprakların homojen şekilde ıslanması sağlanacak şekilde uygulama yapılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Sadece önerilen insektisitlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilir. Kimyasallarla tank karışımı yapılması durumunda alınan sonuçlardan firmamız sorumluluk kabul etmez.



KORUMA Klor Alkali San. ve Tic.A.Ş.

AMANGEL® SL

SUDA ÇÖZÜNEN KONSANTRE (SL)

GRUBU	--	BÖCEK TUZAĞI (PROTEİN BÖCEK CEZBEDİCİ)
-------	----	--

421 g/L Hidrolize Protein

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FIRMA:

KORUMA Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş.
Deniz Mah.Petrol Ofisi Cad. No: 43,41900-
Derince/KOCAELİ
Derince-41100 İZMİT
Tel : (0262)239 22 70 (2 hat)
Fax : (0262)239 22 78
®= KORUMA Klor Alkali San. ve Tic AŞ. 'nin ticari
markasıdır

Gökhan BAŞTUĞ
Teknik Müdür
Ziraat Yüksek Mühendisi

**KORUMA Klor Alkali
Sanayi ve Ticaret A.Ş.**
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No. 43
Derince-KOCAELİ
Tepecik V.D. 564 000 7582

21 Şubat 2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

N. Arıcı
Dr. Nesrin ÇAKIR ARICI
Daire Başkanı



QUILSTAR INVESTMENTS
INCORPORATED
10000 Wilshire Blvd
Suite 1000
Beverly Hills, CA 90210

UNITED STATES OF AMERICA
KORINNA XION AMINON
20100 Wilshire Blvd
Suite 1000
Beverly Hills, CA 90210
Tel: (310) 274-1111
Fax: (310) 274-1112



U.S. DEPARTMENT OF STATE
OFFICE OF THE CHARGÉ D'AFFAIRES
MANILA PHILIPPINES