

İmal Tarihi :
Son kullanma tarihi :
Şarj No: (Damga ile) :
Ruhsat tarih ve no'su :

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR		
BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Buğday	Tahıl Külleme (<i>Erysiphe graminis</i>)	35 gün
	Septorya Yaprak lekesi (<i>Septoria tritici</i>)	35 gün
Buğday, Arpa	Kök ve Kökboğazi Çürüklüğü (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i>)	35 gün
Arpa	Yaprak yanıklığı (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	35 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılmaktadır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakinden karışım su depoya ilave edilir. Karıştırılmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmaz. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

05 Mayıs 2023
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Umit Uğur BAHÇE
Daire Başkanı V.2023



ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:
Özel bir antidötü yoktur. Başvuya şemptomatik tedavi uygulanması yeterlidir.
UZEM, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) TEL: 114



KORUMA Klor ALKALI SAN. VE TİC. A.Ş.

KAPRALE®

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUP G2:5 G1:3 FUNGİSİT(MANTAR İLACI)

300 gr/L Spiroxamine + 160 g/L Prothioconazole

Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, grda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün buhar ve/veya zerrelere tutunmayınız.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey

yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

İlaçlanmış sahaya insan ve hayvan girmesinde sınırlama yoktur.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım

talimatına uyunuz.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI

KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajın dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu

uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri gösterir.

İLK YARDIM ÖNEMLERİ:

Genel bilgi Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Bu

Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin.

Solonması halinde Maruz kalan kişiye temiz havaya çıkarın ve rahat nefes

alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Yaka, kravat veya

kemer gibi giyşinin sıkı bölümlerini gevşetin. Belirtiler ciddi veya kalıcı ise

tıbbi yardım alın.

Yutulması halinde Ağzı suyla iyice çalkalayın. Birkaç bardak su veya süt

içirin. Kusma tehlikesi olabileceğinden dolayı, kazazede kendini rahatsız

hissederse kusmayı durdurun. İkinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey

vermeyin. İkinci yerinde olmayan kişiye ilk yardım pozisyonunda yan

tarafına yatırın ve solunumun gerçekleşebilmesi için sağlayın. Kazazedeyi

gözlem altında tutun. Belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.

Cilt ile teması halinde Maddenin hemen cildin üzerinden alınması

önemlidir. Gelişmekte olan herhangi bir hassasiyet belirlisi durumunda,

daha fazla maruziyetten kaçınılmalıdır. Kırılığı sabun ve suyla veya bilinen

cilt temizleyici bir madde ile temizleyin. Yıkamanın ardından belirtiler ciddi

veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.

Göz ile teması halinde Hemen bol su ile yıkayın. Gözlerinizi ovmayın.

Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15 dakika

yıkamaya devam edin ve tıbbi yardım alın.

Net Miktarı (kg veya L) :
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER Spiroxamine, Prothioconazole



UYARI KELİMESİ TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.

H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu

organlarda hasara yol açabilir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya

sigara içmeyin.

P273 Çevreye verilmemesinden kaçınınız.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz

koruyucu kullanınız.

P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi

yardım/ bakım alın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi

yardım/ müdahale alın.

P405 Kilit altında saklayınız.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EU401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek

için, kullanma talimatlarına uyun.

Ünet SAZAK
Ankara Bölge Müdürü
#KORUMA Klor Alkali
Sarıyeri Yolu, Sarıyeri Mahallesi, Cad.
No:43 Kat:10/1000 7582
Tepecik, Beşiktaş, İstanbul
Tic. Sic. No: 271100, Nispetiye 41Y

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT**EDİLECEK HUSUSLAR:**

- Balıklara zehirlidir. sulara bulaştırmayınız.
- Arlara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında kullanmayınız.
- Rüzgârlı havada uygulama yapmayınız
- Boş ürün ambalajlarını başka gaye için kullanmayınız.
- Usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Uygulama esnasında genel korunma tedbirlerine mutlaka uyunuz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile üretilen ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA:

KORUMA KLOR ALKALI SAN. VE TİC. A.Ş.
DENİZ MAH. PETROL OFİSİ CAD. No:43,
41900-Derince/KOCAELİ
Tel : (0262)239 22 70 (2 hat)
Faks:(0262)229 33 24

®= KORUMA KLOR ALKALI SAN. VE TİC AŞ. 'nin tescilli markasıdır.

Ünet SAZAK
Ankara Bölge Müdürü

KORUMA KLOR ALKALI
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad.
No:43 41900 KOCAELİ
Tescilli No:54 000 7582
Tic. No:Denince 417



KORUMA KLOR ALKALI SAN. VE TİC. A.Ş.

KAPRALE®

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUP	G2:5	G1:3	FUNGİSİT(MANTAR İLACI)
------	------	------	------------------------

300 gr/L Spiroxamine + 160 g/L Prothioconazole

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:**Buğdayda Tahıl Külemesi**

İklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağın hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam uygulamasına başlanmalıdır.

Buğday Septorya Yaprak Lekesi: Normal koşullarda ekonomik olmamakla beraber, eğer iklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun geliyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması yapılabilir. Kardeşlenme başlangıcından itibaren yağışlı havalardan itibaren Septorya zararı artar. Uygulama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Ancak burada da çok geç uygulamak doğrudur. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru türmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde, tarla bulaşksa ve başaklanma döneminde yağışlı havalardan devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden uygulama gerek duyulabilir.

Buğday ve Arpada Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü: Tohumluk ekiminden önce tohum ilaçlaması yapılır. Tohumluğun ilaçlama düzeneği olan selektörlerde ilaçlaması tercih edilmelidir. Selektör bulunmayan yerlerde ilaçlama bidoonları ile ilaçlama yapılır. İlaçlamada kullanılan bitki koruma ürününün tohumun bütün yüzeyini tamamen kaplanmasına özen gösterilmelidir. Yeşil aksam ilaçlaması kardeşlenme ve bayrak yaprağı arasındaki devrede yapılmalıdır.

Arpa Yaprak Yanıklığı: Hastalık etmeninin ilk lekeleri görüldüğünde yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

KAPRALE adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G2:5 ve G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlama uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **KAPRALE**'nin aynı üretim sezonunda önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G2:5 ve G1:3 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU:

"İnsektisit+ yaprak gübresi" ya da "herbisit + yaprak gübresi" şeklinde yapılan üçlü karışımlardan kaçınılmalıdır.



05 Mayıs 2023
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.